



Recto

• gripai līdzīgs sindroms (locītavu un muskuļu sāpes ar drudzi).
Ja novērojat jebkuru no šīm pazīmēm, nekavējoties pastāstiet par to ārstam. Ja Jums rodas jautājumi par ārstēšanu, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Svarīgi ir nekavējoties pastāstīt ārstējošajam ārstam par grūtniecību vai jebkādam blakusparādībām, kas var rasties Opsumit lietošanas laikā.
Ārstniecības iestāde:

Ārstējošā ārsta vārds, uzvārds:

Ārstējošā ārsta tālruna numurs:

Pacienta kartīte **Opsumit**
macitentāns
(macitentanum)

Šajā kartītē aprakstīta būtiska informācija par drošumu, kas Jums jāzina, lietojot Opsumit.
Vienmēr nēsājiet šo kartīti līdz un uzrādiet visiem ārstiem, kas iesaistīti Jūsu aprūpē.

LV

• j gripā panašūs simptomi (sāņariņi ir raumenų skausmai bei karščiavimas).
Pastebējē bet kurj iš šių požymių, nedelsdami pasakykite gydytojui. Jeigu kiltų klausimų apie gydymą, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Apie nēštumą ar bet kokj šalutinį poveikį, kuris gali pasireikšti vartojant Opsumit, būtina nedelsiant pranešti savo gydytojui.
Gydymo vieta:

Receptą išrašiusio gydytojo pavardė:

Receptą išrašiusio gydytojo telefono numeris:

Paciento kortelė **Opsumit**
macitentanas

Šioje kortelėje yra pateikiama svarbi saugos informacija, kurią privalote žinoti gydydamiesi Opsumit.
Šią kortelę visada nešiokitės su savimi ir parodykite Jus gydančiam gydytojui.

LT

• gripilaadne sūndroom (liigese- ja lihasevalu koos palavikuga).
Nende nähtude tekkimisel pöörduge kohe arsti poole. Kui teil on oma ravi kohta küsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedusest või tekinud kõrvaltoimest ravi ajal Opsumitiga on tähtis kohe teatada oma raviarstile.
Raviasutus:

Ravi määranud arsti nimi:

Ravi määranud arsti telefoninumber:

7122120

Patsiendikaart **Opsumit**
matsitentaan

See kaart sisaldab tähtsat ohutuselast teavet, millest peaksite olema teadlik ravi saamisel Opsumitiga.
Kandke seda kaarti alati kaasas ja näidake seda igale teid ravivale arstile.

ET



Verso

Rasedus
Opsumit võib kahjustada loote arengut. Seetõttu ei tohi te raseduse ajal Opsumiti võtta ega raseduda ravi ajal Opsumitiga. Kui teil on pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon, võib rasedumine pealegi teie haigussümptomeid oluliselt süvendada.
Rasestumisvastased vahendid
Opsumiti kasutamise ajal peate kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Kui teil on küsimusi, pidage nõu oma arstiga.

Enne Opsumitiga ravi alustamist ja ravi ajal üks kord kuus tuleb teha rasedustest, isegi kui te arvate, et ei ole rase.
Nagu teisedki samasse rühma kuuluvad ravimid, võib Opsumit kahjustada maksa. Arst teeb teile enne Opsumitiga ravi alustamist ja ravi ajal vereanalüüsi, et veenduda, et teie maks töötab normaalselt.

Häireteie maksa töös võivad viidata järgmised nähud:
• iiveldus (tung oksendada)
• oksendamise
• palavik (kõrge kehatemperatuur)
• kõhuvalu
• kollatõbi (naha või silmavalgete kollaseks muutumine)
• uriini tumedaks värvumine
• nahasügelus
• letargia või kumatus (ebatavaline väsimustunne)

Nēštumas
Opsumit gali pažeisti vaisiaus vystymąsi. Dėl to Opsumit negalite vartoti, jei laukiatės, ir neturėtumėte pastoti, jei vartojate Opsumit. Be to, jei sergate plaučių arterine hipertenzija, nēštumas gali tik pasunkinti Jūsų ligos simptomus.
Kontracepcija
Vartodami Opsumit privalote vartoti veiksmingas kontraceptines priemones. Visus kilusius klausimus pateikite savo gydytojui.

Prieš pradėdama vartoti Opsumit bei kiekvieną gydymo mėnesį turėtumėte atlikti nēštumo mėginį (net jei manote, kad nesilaukiate).
Kaip ir kiti šios klasės vaistai, Opsumit gali pažeisti kepenis. Prieš pradėdant gydyti Opsumit bei gydymo metu gydytojas paskirs paimti Jūsų kraujo mėginius ir atliks tyrimus, kad nustatytų, ar Jūsų kepenys yra sveikos.

Požymiai, reiškiantys, kad Jūsų kepenys gali būti pažeistos:
• pykinimas (noras vemti);
• vėmimas;
• karščiavimas (aukšta temperatūra);
• skausmas skrandyje (pilve);
• gelta (odos arba akių baltymų pageltimas);
• tamsios spalvos šlapimas;
• odos niežulys;
• mieguistumas arba nuovargis (neįprastas pavargimas ar išsekimas);

Grūtniecība
Opsumit var kaitēt augļa attīstībai. Tāpēc Opsumit nedrīkst lietot grūtniecības laikā, un Opsumit lietošanas laikā Jums nedrīkst iestāties grūtniecība. Turklāt, ja slimojat ar plaušu arteriālu hipertensiju, grūtniecības iestāšanās var būtiski pasliktināt slimības simptomus.
Kontracepcija
Opsumit lietošanas laikā Jums jālieto efektīva pretapaugļošanās metode (kontracepcijas metode). Pārrunājiet visus neskaidros jautājumus ar ārstu.

Pirms Opsumit lietošanas uzsākšanas un reizi mēnesī ārstēšanas laikā Jums jāveic grūtniecības tests, pat tad, ja domājat, ka Jums nav grūtniecības.
Tāpat kā citas šīs grupas zāles, Opsumit var ietekmēt aknu darbību. Ārsts Jums nozīmēs asins analīzi pirms Opsumit lietošanas uzsākšanas un ārstēšanas laikā, lai pārbaudītu, vai Jums nav aknu darbības traucējumu.

Pazīmes, kas liecina par aknu darbības traucējumiem:
• slihta dūša (vēlēšanās vemt);
• vemšana;
• drudzis (augsta temperatūra);
• sāpes vēderā;
• dzelte (ādas vai acu baltumu dzeltēna nokrāsa);
• tumšas krāsas urīns;
• ādas nieze;
• miegainība vai nogurums (neparasts nogurums vai spēka izsīkums);

AUTOMATED LEGEND (CC-PC)		Product Artwork			
Card OPSUMIT		Latest Modification Date: December 03, 2024 04:24 PM			
PCC: 7122120		Artwork Operator: V_PP		Version: 2	

Folded dimension of this card:
70 x 50 mm

