

Tolvaptanas Paciento kortelė

Paciento pavardė

Pirmojo tolvaptano paskyrimo data

Gydytojo pavardė

Ligoninės pavadinimas ir tel.

Svarbi saugumo informacija pacientams

Tolvaptanas gali sutrikdyti kepenų funkciją.

Pasikonsultuokite su gydytoju, jeigu pasireikštų silpnumas, apetito stoka, skausmas arba nemalonių pojūčių viršutinėje pilvo dalyje, karščiavimas, šlapimo patamsėjimas arba odos ar akių gelta, sąnarių ir raumenų skausmas su karščiavimu (gripą primenantis sindromas), niežulys, pykinimas arba vėmimas.

Tolvaptanas gali sukelti sunkią dehidrataciją (skysčių netekimą).

Gerkite daug skysčių, kad išvengtumėte dehidratacijos (daug skysčių netekimo), ir pasitarkite su gydytoju, jei negalite gerti.

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant pakuotės lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos šiais būdais:

- tiesiogiai užpildant formą internetu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistinių preparatų informacinėje sistemoje https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrv/PATIENT_PUBLIC;
- užpildant paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją formą, kuri skelbiama <https://vvkt.lrv.lt/lt>, ir atsiunčiant elektroniniu paštu (adresu NepageidaujamaR@vvkt.lt);
- nemokamu telefonu 0 800 73 568.

Svarbi saugumo informacija
skubiąją pagalbą teikiančiam personalui

Tolvaptanas gali sukelti kepenų pažeidimą. Būtina periodiškai kartoti kraujo tyrimus, skirtus kepenų funkcijai įvertinti (pirmuosius 18 mėn. – kas mėnesį, gydant toliau – kas 3 mėn.). Gydymą reikia sustabdyti arba nutraukti, jei reikšmingai padidėja kepenų fermentų aktyvumas ir (arba) išlieka klinikiniai kepenų pažeidimo simptomai.

Tolvaptanas gali žymiai didinti šlapimo kiekį, o tai gali sukelti stipriai išreikštą dehidrataciją (daug skysčių netekimą). Galimi dehidratacijos simptomai yra padidėjęs troškulys, sausa burna, nuovargis ar mieguistumas, sumažėjęs šlapimo kiekis, galvos skausmas, sausa oda, svaigulys, dažni širdies susitraukimai, sutrikusi orientacija ir mažas odos elastingumas.

Daugiau informacijos pateikiama https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2023/20230915160385/anx_160385_lt.pdf