

Paciento kortelė

Ši paciento kortelė suteikia svarbios informacijos apie Teriflunomide Olpha rizikas. Prašome kortelę saugoti saugioje vietoje ir parodyti šią kortelę bet kuriam gydytojui arba sveikatos priežiūros specialistui, dalyvaujančiam Jūsų medicininiame gydyme (pvz., skubios pagalbos atveju). Taip pat turėtumėte perskaityti pacientų informacinį lapelį, jog gautumėte daugiau informacijos apie vaistinį preparatą.

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant pakuotės lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos šiais būdais:

- tiesiogiai užpildant formą internetu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistinių preparatų informacinėje sistemoje https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrv/PATIENT_PUBLIC;
- užpildant paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją formą, kuri skelbiama <https://vvkt.lrv.lt/lt>, ir atsiunčiant elektroniniu paštu (adresu NepageidaujamaR@vvkt.lt);
- nemokamu telefonu 0 800 73 568.

Apie šalutinį poveikį taip pat galima pranešti Olpha AS:
Tel: +370 61107664



Teriflunomide Olpha Paciento kortelė

Paciento vardas: _____

Pirmo teriflunomido paskyrimo data: _____

Gydymo įstaiga: _____

Gydytojo neurologo vardas: _____

Neurologo skubios pagalbos telefono numeris: _____

Dėl detalesnės informacijos, galite susisiekti:
Olpha AS, Tel: +370 61107664

Svarbios nepageidaujamos reakcijos

Teriflunomidas mažina imuninės sistemos aktyvumą (veikia kaip imunomodulatorius). Kai kuriems žmonėms teriflunomidas gali sukelti kepenų pažeidimus (hepatitą), taip pat gali sumažinti baltųjų kraujo ląstelių, kovojančių su infekcijomis (neutrofilų), ir trombocitų, dalyvaujančių kraujo krešėjime, gamybą. Jūsų kepenų funkcijos tyrimai ir kraujospūdis turėtų būti reguliariai tikrinami gydymo teriflunomidu metu, o pilnas kraujo tyrimas turėtų būti atliekamas prireikus. Šie tyrimai taip pat turėtų būti atlikti prieš pradėdant gydymą.

Jeigu pasireiškė bet kuri iš žemiau nurodytų nepageidaujamų reakcijų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją:

- Geltona odos spalva arba akių pageltimas, tamsesnis nei įprastai šlapimas, nepaaiškinamas pykinimas arba vėmimas, pilvo skausmas. Šie simptomai susiję su kepenų pažeidimais.
- Karščiavimas, drebėjimas, šaltkrėtis, padidėję limfmazgiai, sumažėjęs šlapimo kiekis ar skausmas šlapinantis, sumišimo jausmas. Tai gali būti infekcijos požymiai.

Vaisingo amžiaus moterims, įskaitant mergaites, ir jų tėvams / globėjams

- Nereikėtų pradėti vartoti teriflunomido, jei esate nėščia arba manote, kad galite būti nėščia arba esate vaisingo amžiaus ir nenaudojate efektyvių kontracepcijos priemonių, nes šis vaistas gali sukelti rimtų vaisiaus vystymosi defektų. Gydytojas gali paprašyti atlikti nėštumo testą, jog įsitikintų, kad nesate nėščia.
- Vartojant teriflunomidą, naudokite efektyvias kontracepcijos priemones. Praneškite gydytojui, jei norite pakeisti kontracepcijos metodą ar planuojate pastoti po gydymo teriflunomidu nutraukimo. Taip pat turėtumėte aptarti su gydytoju, jei planuojate ar maitinate krūtimi;
- Jei įtariate, jog esate nėščia, vartojant teriflunomidą ar per dvejus metus po gydymo nutraukimo, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Jei testas patvirtina, kad esate nėščia, gydytojas gali pasiūlyti gydymą tam tikrais vaistais, kad pagreintintų teriflunomido pašalinimą iš Jūsų organizmo, nes tai gali sumažinti riziką Jūsų kūdikiumi;
- Mergaičių tėvai / globėjai turėtų kreiptis į dukters gydytoją, kai jai prasideda menstruacijos, kad būtų gauta konsultacija apie vystymosi defektų riziką nėštumo metu ir būtų informuota apie tinkamą kontracepciją.