

Šioje atmintinėje yra svarbios saugumo informacijos, kurią turite žinoti prieš pradėdant gydymą ir gydymo denozumabu (Obodence) metu.

▼ Vykdoma papildoma šio vaisto stebėseną. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį.

Jūsų gydytojas rekomendavo vaistinį preparatą denozumabą (**Obodence**), kuris vartojamas osteoporozėi ir kaulų masės sumažėjimo gydymui. Dėl šios ligos kaulai retėja ir silpnėja, todėl lengvai lūžta.

Retai (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 1000 asmenų) gauta pranešimų apie nepageidaujamą poveikį, vadinamą žandikaulio osteonekroze (ŽON) (žandikaulio pažaidą) pacientams, kurie osteoporozės gydymui vartojo denozumabą. Žandikaulio osteonekrozė taip pat gali pasireikšti ir baigus gydymą.

Svarbu stengtis išvengti žandikaulio osteonekrozės išsivystymo, nes ši būklė sukelia skausmą ir ją sunku gydyti. Siekiant sumažinti žandikaulio osteonekrozės išsivystymo pavojų, turite imtis tam tikrų atsargumo priemonių.

Prieš pradėdant gydymą.

Pasakykite gydytojui ir (arba) slaugytojui (sveikatos priežiūros specialistui), jeigu turite burnos ar dantų problemų.

Gydytojas gali rekomenduoti patikrinti dantis prieš pradėdant gydymą, jeigu:

- anksčiau buvote gydytas kitais bisfosfonatais;
- vartojate vaistus, vadinamus kortikosteroidais (tokius kaip prednizolonas arba deksametazonas);
- rūkote;
- sergate vėžiu;
- ilgesnį laiką nebuvo atliekama dantų patikra;
- turite burnos ar dantų problemų.

Gydymo metu.

- Turite palaikyti gerą burnos higieną ir reguliariai tikrintis dantis. Jei nešiojate dantų protezus, įsitikinkite, kad jie Jums gerai tinka.
- Jei gydomi Jūsų dantys ar bus atliekama dantų operacija (pvz., danties traukimas), informuokite gydytoją apie dantų gydymą ir pasakykite odontologui, kad vartojate denozumabą.
- Nedelsiant praneškite gydytojui ir odontologui, jei atsiranda bet kokios burnos ar dantų problemos, tokios kaip dantų iškritimas, skausmas, patinimas, negyjančios žaizdos ar išskyros, nes tai gali būti žandikaulio osteonekrozės požymiai.

Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje, kuris pridėtas prie vaisto.

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant pakuotės lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos šiais būdais:

- tiesiogiai užpildant formą internetu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistinių preparatų informacinėje sistemoje https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrv/PATIENT_PUBLIC;
- užpildant paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją formą, kuri skelbiama <https://vvkt.lrv.lt/lt>, ir atsiunčiant elektroniniu paštu (adresu NepageidaujamaR@vvkt.lt);
- nemokamu telefonu 0 800 73 568

Versija 1.0, 2026 m. gegužės mėn.