

PACIENTO PRIMINIMO KORTELĖ

Denozumabas (Zvogra®)



PACIENTO PRIMINIMO KORTELĖ

Denozumabas (Zvogra®)

Šioje paciento priminimo kortelėje yra svarbios saugumo informacijos, kurių turite žinoti prieš pradėdami gydymą ir gydymo metu denozumabo (Zvogra®) injekcijomis, kurios leidžiamos esant vėžio sukeltoms būklėms.

Jūsų gydytojas Jums rekomendavo vartoti denozumabo (Zvogra®) injekcijas siekiant išvengti kaulų komplikacijų (pvz., lūžių), kurias sukelia metastazės kauluose arba kaulų vėžys.

Dažnai (ne daugiau kaip 1 iš 10 asmenų) gauta pranešimų apie nepageidaujamą poveikį, vadinamą žandikaulio osteonekroze (ŽON, žandikaulio pažaidą), pasireiškusių vėžiu sergantiems pacientams, kuriems yra leidžiamos denozumabo (Zvogra®) injekcijos. Žandikaulio osteonekrozė gali pasireikšti ir baigus gydymą.

Svarbu stengtis išvengti žandikaulio osteonekrozės išsivystymo, nes ši būklė sukelia skausmą ir ją gali būti sunku gydyti. Siekiant sumažinti žandikaulio osteonekrozės išsivystymo riziką, turite imtis tam tikrų atsargumo priemonių.

PRIEŠ PRADEDANT GYDYMĄ

- Pasitarkite su gydytoju. Jis gali rekomenduoti Jums pasitikrinti dantis prieš pradėdami gydymą denozumabu (Zvogra®).
- Pasakykite gydytojui arba slaugytojui (sveikatos priežiūros specialistui), jeigu turite burnos ar dantų problemų.

Pacientams, kuriems atliekamos dantų chirurginės procedūros (pvz., danties traukimas), neatliekantiems įprastinės dantų priežiūros ar sergantiems dantenu ligomis, rūkantiems pacientams, taip pat pacientams, kuriems taikomas įvairių tipų vėžio gydymas, žandikaulio osteonekrozės rizika yra didesnė.

GYDymo METU

- Turite palaikyti gerą burnos higieną ir reguliariai tikrintis dantis. Jeigu nešiojate dantų protezus, įsitikinkite, kad jie Jums gerai tinka.
- Jeigu gydomi Jūsų dantys ar bus atliekama dantų operacija (pvz., danties traukimas), informuokite gydytoją apie dantų gydymą ir pasakykite odontologui, kad vartojate denozumabą (Zvogra®).
- Nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir odontologą, jeigu atsiranda burnos ar dantų problemų, tokių kaip dantų kritimas, skausmas ar patinimas, negyjančios žaizdos ar išskyros, nes tai gali būti žandikaulio osteonekrozės požymiai.

Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje, kuris pridėtas prie vaisto.

PRA NEŠIMAS APIE ŠALUTINĮ POVEIKĮ

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant pakuotės lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui.

Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos šiais būdais:

- tiesiogiai užpildant formą internetu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistinių preparatų informacinėje sistemoje https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrv/PATIENT_PUBLIC;
- užpildant paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją formą, kuri skelbiama <https://vvkt.lrv.lt/lt>, ir atsiunčiant elektroniniu paštu (adresu NepageidaujamaR@vvkt.lt);
- nemokamu telefonu +370 800 73 568.

- ▼ Vykdoma papildoma vaistinio preparato stebėseną. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškusių šalutinį poveikį.