

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Enne kasutamist hoolikalt loksutada. Retseptiravim. Laikyti šaldytuve. Neužšaldyti. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistinis preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Receptinis vaistas. Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Pirms lietošanas rūpīgi sakratīt. Receptu zāles.

GSK Vaccines GmbH
Emil-von-Behring-Str. 76, 35041 Marburg
Saksamaa/ Vokietija/ Vācija
Müügi loa nr: 371602
LT/1/02/2743/001
LV Reģ. Nr. 01-0316

Süstesuspensioon süstlis. 1 süstel (0,25 ml) koos nõelaga/ Injekcinė suspensija užpildytame švirkšte. 1 užpildytas švirkstas (0,25 ml) su adatu/ Suspensija injekcijām pilnšīrcē. 1 pilnšīrcē (0,25 ml) ar adatu



ENCEPUR CHILDREN

Encepur children, 0,25 ml süstesuspensioon süstlis. *Vaccinum encephalitis ixodibus adjectae inactivatum*
Encepur children 0,25 ml injekcinė suspensija užpildytame švirkšte. *Vaccinum encephalitis ixodibus adjectae inactivatum*
Encepur Children 0,25 ml suspensija injekcijām pilnšīrcē. *Vaccinum encephalitis ixodibus adjectae inactivatum*



39.5x21.5x132.5
A91

1 immuniseeriv annus (0,25 ml süstesuspensiooni) sisaldab 0,75 mikrogrammi inaktiveeritud puukentsellulidi viiruse tüve K23* adsorbeeritud hüdreeritud alumiiniumhüdroksiidil (0,15-0,2 mg AP⁺). *peremeessüsteem: primaarsed kana embrüonaalsete rakkude kultuurid (PCEC)

1 dozėje (0,25 ml injekcinės suspensijos) yra 0,75 mikrogramo inaktyvuoto erkinio encefalito viruso (K23 padermės) adsorbuoto ant hidratuoto aliuminio hidroksido (0,15-0,2 mg AP⁺).

1 imunizācijas deva (0,25 ml suspensijas injekcijām) satur 0,75 mikrogramus inaktivēta ērcu encefalīta vīrusa / K 23 celma, kas adsorbēts uz alumīnija hidroksīda (0,15-0,2 mg AP⁺)

496304

ENCEPUR
CHILDREN

Abiained: naatriumkloriid, sahharoos, trometamool, süstevesi. Intramuskulaarne või subkutaanne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Mitte süstida intravaskulaarselt. Vaktsiin on näidustatud 1...11-aastastele lastele. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Kaubamärgid kuuluvad või on litsentseeritud GSK-le. ©2018 GSK või litsentsianija.



Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, sacharozė, trometamolis, injekcinis vanduo. Leisti į raumenis ar po oda. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Prieš vartojimą reikia atidžiai supurtyti. Nešvirkti į kraujagyslę. Vaikams nuo 1 iki 11 metų imtinai. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Prekių ženklai priklauso GSK arba GSK turi jiems licenciją. ©2018 GSK arba licencijos turėtojas.

Nātrija hlorīds, saharoze, trometamols, ūdens injekcijām. Intramuskulārai vai subkutānai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Neinjicēt intravaskulāri. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Lietošanai bērniem no 1 līdz 11 gadu vecumam. Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas GSK. ©2018 GSK vai tās licencijārs.

PC 04742041003157
EXP
Lot

ENCEPUR® CHILDREN

0,25 ml

Lot:

ENCEPUR® CHILDREN

0,25 ml

Lot:

Lot:

EXP:

0,25 ml süstesuspensioon süstis/
injektsioon suspensija užpildytame

švirkste/ suspensija injekcijām pilnšļircē

Vaccinum encephalitis inodibus

adjectae inactivatum

1 annus/ 1 doze/ 1 deva (0,25 ml)

i.m., s.c.

GSK

ENCEPUR®

CHILDREN 0,25 ml

488010