

b e t a d i n e szóköz t e p a l a s

Laikyti vaikams nepasiekiamoje
ir nepastebimoje vietoje.
Laikyti ne aukštesneje kaip 25 °C temperatūroje.



Betadine[®] 100 mg/g tepalas

Joduotas povidonas

20 g tepalas

Vartoti ant odos.

EGIS

Betadine[®]
tepalas

6165281D

Indikacijos. Ant odos tepamas plataus veikimo antiseptikas, skirtas nedidelių įpjovimų ar nubrodinimų, nedaug ploto apimančių nudegimų sukeltoms infekcinėms ligoms gydyti ar profilaktikai. Juo rekomenduojama gydyti grybelines bei bakterines odos infekcines ligas ir pragulų bei trofinių opų sukeltas infekcines ligas.

Dozavimas. Gydamt infekcines ligas reikia tepėti 1 arba 2 kartus per parą ne ilgiau kaip 14 dienų. Tepėti nuvalytą, nusausintą pažeistą odą. Ją galima uždengti tvarščiu ar aprišti.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas jodui, skydliaukės ligos, dermatitas, prieš gydymą radioaktyviuoju jodu bei scintigrafiją.
Atsargumo priemonės. Jei sudirgsta oda ar atsiranda padidėjusio jautrumo reakcija, tepalo reikia nebevertoti.

1 g tepalo yra **100 mg joduoto povidono**.

Pagalbinės medžiagos: natrio-vandenilio karbonatas, makrogolis 400, makrogolis 4000, makrogolis 1000, makrogolis 1500, išgrynintas vanduo.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Nereceptinis vaistinis preparatas

Pradėto vartoti tepalo tinkamumo laikas yra 2 metai.



EGIS PHARMACEUTICALS PLC
1106 BUDAPEST, Keresztúri út 30-38, VENGRIJA
Licencija: MUNDIPHARMA AG - Basel, Šveicarija



LT/1/96/1802/001

Serijs
Tinkis Nr.

Betadine[®] 100 mg/g tepalas

Joduotas povidonas

20 g tepalas

Vartoti ant odos.

1 g tepalo yra **100 mg joduoto povidono**. Pagalbinės medžiagos: natrio-vandenilio karbonatas, makrogolis 400, makrogolis 4000, makrogolis 1000, makrogolis 1500, išgrynintas vanduo. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Nereceptinis vaistinis preparatas. Pradėto vartoti tepalo tinkamumo laikas yra 2 metai. **Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.** Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. *Indikacijos.* Ant odos tepamas plataus veikimo antiseptikas, skirtas nedidelių įpjovimų ar nubrozdinimų, nedaug ploto apimančių nudegimų sukeltoms infekcinėms ligoms gydyti ar profilaktikai. Juo rekomenduojama gydyti grybelines bei bakterines odos infekcines ligas ir pragulų bei trofinių opų sukeltas infekcines ligas. *Dozavimas.* Gydant infekcines ligas reikia tepti 1 arba 2 kartus per parą ne ilgiau kaip 14 dienų. Tepti nuvalytą, nusausintą pažeistą odą. Ją galima uždengti tvarščiu ar aprišti. *Kontraindikacijos.* Padidėjęs jautrumas jodui, skydliaukės ligos, dermatitas, prieš gydymą radioaktyviuoju jodu bei scintigrafiją. *Atsargumo priemonės.* Jei sudirgsta oda ar atsiranda padidėjusio jautrumo reakcija, tepalo reikia nebevartoti.



EGIS PHARMACEUTICALS PLC
1106 BUDAPEST, Keresztúri út 30-38, VENGRIJA
Licencija: MUNDIPHARMA AG - Basel, Šveicarija



LT/1/96/1802/001

EGIS

6165284C