



163978861706
X1505R
04/2025

N/Lote/VAL PC: 03574661504094
6 mg/ml + 0,25 mg/ml Xarope cloridrato de pseudoefedrina + cloridrato de triprolidina

Actifed®

Actifed®

6 mg/ml + 0,25 mg/ml Xarope cloridrato de pseudoefedrina + cloridrato de triprolidina

Xarope 100 ml Via oral.

Actifed®

6 mg/ml + 0,25 mg/ml Xarope cloridrato de pseudoefedrina + cloridrato de triprolidina



LE321803

Actifed 6 mg/0,25 mg/ml sirupas 100 ml

pseudoefedrino hidrokloridas / triprolidino hidrokloridas

1 ml sirupo yra 6 mg pseudoefedrino hidroklorido ir 0,25 mg triprolidino hidroklorido. Sudėtyje yra sacharozės, metilo parahidroksibenzoato (E218), saulėlydzio geltonojo FCF (E110) ir natrio benzoato (E211). Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir rėpasiekiamoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. Mažina nosies ir viršutinių kvėpavimo takų užgulimą peršalus, slopina nosies tekėjimą ir čiaudulį.

Dozavimas. Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams gerti po 10 ml kas 4-6 val. ne daugiau kaip 4 kartus per parą. Actifed draudžiama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams.

DĖMESIO! Vaistas gali sukelti mieguistumą, todėl jį vartojant nereikėtų vairuoti automobilio ar dirbti su mechanizmais. Gydyimo metu negalima vartoti alkoholio. Nereceptinis vaistas.

Gamintojas: Delpharm Orleans, 5, avenue de Concy, 45071 Orleans Cedex 2, Prancūzija.

Lygiagretus importuotojas: UAB „Limedika“.

Perpakavo: Medezin Sp. z o.o.

Tinka iki: Serija:

Perpakavimo serija:

LT/LI

Lygiagrečiai importuojamas vaistas skiriasi nuo referencinio vaisto pagalbinėmis medžiagomis: referencinio vaisto sudėtyje papildomai yra natrio hidroksido.



Actifed®

6 mg/ml + 0,25 mg/ml Xarope cloridrato de pseudoefedrina + cloridrato de triprolidina

Xarope 100 ml Via oral.

Cada ml de xarope contém 6 mg de cloridrato de pseudoefedrina e 0,25 mg de cloridrato de triprolidina.

Contém sacarose, para-hidroxibenzoato de metilo (E218), benzoato de sódio (E211), sódio, amarelo sol FCF (E110) e amarelo de quinoleína (E104). Consultar o folheto informativo para mais informações.

Consultar o folheto informativo antes de utilizar.

Mantar fora da vista e do alcance das crianças.

Conservar a temperatura inferior a 25°C.

Conservar na embalagem de origem para proteger da luz.

Medicamento sujeito a receita médica



Skaidrus lipdukas, kuris uždengia brailio raštą.