



**Troxevasin® 300 mg**  
kietosios kapsulės/kōvakapslid  
*Troxeerutinum*

50 kietųjų kapsulių/kōvakapslit  
Vartoti per burną/Suukaudne

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 300 mg trokserutino. Sudėtyje yra laktozės monohidrato ir saulėlydžio geltonojo FCF (E110). Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės. Nereceptinis vaistas. Vaistas skirtas lėtinio venų nepakankamumo simptomams, pvz., kojų skausmui, sunkumui, patinimui lengvinti. Dozavimas. Rekomenduojama pradinė dozė - 1 kapsulė 2 kartus per parą. Rekomenduojama palaikomoji dozė - 1 kapsulė parai. LT/1/13/3390/001

Teva B.V.  
Swensweg 5  
2031 GA Haarlem  
Nyderlandai/Holland

**Troxevasin® 300 mg**  
kietosios kapsulės/kōvakapslid  
*Troxeerutinum*

50 kietųjų kapsulių/kōvakapslit  
Vartoti per burną/Suukaudne

Ūks kōvakapsel sisaldab 300 mg trokserutiini. Sisaldab laktoosi ja pāikeselojangukollast (E110). Lisainformatsiooni vt pakendi infolehest. Hoida laste eest varjatud ja kattesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Kāsīmūūgīravim. Nāidustus: Tāiendava ravimina jalaveenide krooniliseest puudulikuseest tingitud turse korral. Annustamine: Soovitatav algannus on 1 kapsel kaks korda oōpāevas. Soovitatav sāilitusannus on 1 kapsel oōpāevas 2...4 nādala jooksul. Mūūgīloa nr: 409203

Teva B.V.  
Swensweg 5  
2031 GA Haarlem  
Nyderlandai/Holland

**Troxevasin® 300 mg**  
kietosios kapsulės/ kōvakapslid  
*Troxeerutinum*

50 kietųjų kapsulių/kōvakapslit



Braille reads:-  
troxevasin  
300 mg



