



100 kietųjų kapsulių/
kõvakapslit



Troxevasin® 300 mg
kietosios kapsulės/kõvakapslid
Troxerutinum



100 kietųjų kapsulių/kõvakapslit
Vartoti per burną/Suukaudne

Üks kõvakapsel sisaldab 300 mg trokserutiini.
Sisaldab laktoosi ja päikeseloojangukollast (E110). Lisainformatsiooni vt pakendi infolehest.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Käsimüügist.
Näidustus: Täiendava ravimina jalaveenide kroonilisest puudulikkusest tingitud turse korral.
Annustamine: Soovitav algannus on 1 kapsel kaks korda ööpäevas.
Soovitav säilitusannus on 1 kapsel ööpäevas 2...4 nädala jooksul.
Müügiloa nr: 409203

Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nyderlandai/Holland

66836_s1
90x50x100

100 kietųjų kapsulių/
kõvakapslit



Troxevasin® 300 mg
kietosios kapsulės/kõvakapslid
Troxerutinum



100 kietųjų kapsulių/kõvakapslit
Vartoti per burną/Suukaudne

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 300 mg trokserutiino.
Sudėtyje yra laktozės monohidrato ir saulėlydžio geltonojo FCF (E110).
Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.
Nereceptinis vaistas.
Vaistas skirtas lėtinio venų nepakankamumo simptomams, pvz., kojų skausmui, sunkumui, patinimui lengvinti.
Dozavimas. Rekomenduojama pradinė dozė – 1 kapsulė 2 kartus per parą.
Rekomenduojama palaikomoji dozė – 1 kapsulė parai.
LT/1/13/3390/002

Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nyderlandai/Holland

EXP
Lot

Zone for marking

Braille reads:-
troxevasin
300 mg



