



Remodulin® 1 mg/ml ^{LT}
infuzinis tirpalas Treprostinilum

1 ml infuzinio tirpalo yra 1 mg treprostinilio (treprostinilio natrio druskos pavidalu).
 Vartoti tik nuolatinės infuzijos po oda arba į veną (išoriniu arba implantuojamuoju siurbliu) būdu. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
 Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Po pirmojo buteliuko atidarymo praėjus 30 dienų jį sunaikinkite.
 Nuolatinės infuzijos po oda metu vieną neskiesto Remodulin talpyklę (švirkštą) reikia suvartoti per 72 valandas.
 Nuolatinės infuzijos į veną metu vieną praskiesto Remodulin talpyklę (švirkštą) reikia suvartoti per 24 valandas.
 Nuolatinės infuzijos į veną naudojant implantuojamuosius infuzijos siurblius metu praskiestą Remodulin reikia suvartoti per 35 dienas.
 Viename 20 ml buteliuke yra 20 mg treprostinilio (treprostinilio natrio druskos pavidalu). Sudėtyje yra natrio. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje. Sudėtyje taip pat yra šių pagalbinių medžiagų: natrio citrato, natrio chlorido, natrio hidroksido, vandenilio chlorido rūgšties, metakrezolio ir injekcinio vandens.

**Müügiloa hoidja / Registrācijas
 apliecinības ipašnieks / Registruotojas:**
 Ferrer Internacional, S.A.
 Gran Vía Carlos III, 94
 08028 – Barcelona
 Hispania / Spānija / Ispanija **20 ml**

Müügiloa nr: 504705
Reģ Nr.: 07-0201
 LT/1/07/0903/001
 Retseptiravim /
 Receptu zāles /
 Receptinis vaistas

Eesti

Latvija

Lietuva

Remodulin® 1 mg/ml ^{EE}
infusioonilahus Treprostinilum

1 ml infusioonilahust sisaldab 1 mg treprostinili (treprostinilnaatriumina). Ainult subkutaanseks või intravenoosseks püsiinfusiooniks (kehavälise või implanteeritava infusioonipumbaga). Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Avatud viala sisu tuleb ära kasutada 30 päeva jooksul. Subkutaanse püsiinfusiooni korral tuleb üks lahjendamata Remodulin'i mahuti (süstal) ära kasutada 72 tunni jooksul. Intravenoosse püsiinfusiooni korral tuleb üks lahjendatud Remodulin'i mahuti (süstal) ära kasutada 24 tunni jooksul. Intravenoosse püsiinfusiooni korral implanteeritava infusioonipumbaga tuleb lahjendatud Remodulin'i lahus ära kasutada 35 päeva jooksul. Üks 20 ml vialal sisaldab 20 mg treprostinili (treprostinilnaatriumina). Sisaldab naatriumi. Lisateave vt pakendi infoleht. Abiained: naatriumsitraat, naatriumkloriid, naatriumhüdroksiid, vesinikkloriidhape, metakresool ja süstevesi.

Remodulin® 1 mg/ml ^{LV}
šķidums infūzijām Treprostinilum

1 ml infūziju šķīduma satur 1 mg treprostinili (treprostinila nātrija sāli). Tikai nepārtrauktu subkutānu infūziju vai nepārtrauktu intravenozu infūziju veidā (ārējs vai implantējams sūknis). Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Izniciniet flakonu 30 dienu laikā pēc pirmās atvēršanas. Nepārtrauktas subkutānas infūzijas gadījumā vienu neatšķaidīta Remodulin rezervuāru (šjirci) jāizlieto 72 stundu laikā. Nepārtrauktas intravenozas infūzijas gadījumā vienu atšķaidīta Remodulin rezervuāru (šjirci) jāizlieto 24 stundu laikā. Nepārtrauktas intravenozas infūzijas gadījumā, izmantojot implantējamu sūkni, atšķaidīts Remodulin jāizlieto 35 dienu laikā. Viens 20 ml flakons satur 20 mg treprostinila, treprostinila nātrija sāls veidā. Satur nātriju. Papildu informācijai skatīt lietošanas instrukciju. Citas sastāvdaļas (kā palīgvielas): nātrija citrāts, nātrija hlorīds, nātrija hidroksīds, sāļsskābe, metakrezols un ūdens injekcijām.

5017432/3-2110

PC:
 SN:
 Lot:
 Exp:

