



Remodulin® 5 mg/ml ^{LT}
infuzinis tirpals Treprostinilum

1 ml infuzinio tirpalo yra 5 mg treprostinilio (treprostinilio natrio druskos pavidaļu).

Vartoti tik nuolatinės infuzijos po oda arba į veną (išoriniu arba implantuojamuoju siurbliu) būdu. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Po pirmojo buteliuko atidarymo praėjus 30 dienų jį sunaikinkite.

Nuolatinės infuzijos po oda metu vieną neskiesto Remodulin talpyklę (svirkštą) reikia suvartoti per 72 valandas.

Nuolatinės infuzijos į veną metu vieną praskiesto Remodulin talpyklę (svirkštą) reikia suvartoti per 24 valandas.

Nuolatinės infuzijos į veną naudojant implantuojamuosius infuzijos siurblius metu praskiestą Remodulin reikia suvartoti per 35 dienas.

Viename 20 ml buteliuke yra 100 mg treprostinilio (treprostinilio natrio druskos pavidaļu). Sudėtyje yra natrio. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje. Sudėtyje taip pat yra šių pagalbinių medžiagų: natrio citrato, natrio chlorido, natrio hidroksido, vandenilio chlorido rūgšties, metakrezolio ir injekcinio vandens.

**Müügiloa hoidja / Registrācijas
apliecības ipašnieks / Registruotojas:**
Ferrer Internacional, S.A.
Gran Vía Carlos III, 94
08028 – Barcelona
Hispaania / Spānija / Ispanija

20 ml

Müügiloa nr: 504405
Reģ Nr.: 07-0203
LT/1/07/0903/003
Retseptiravim /
Receptšu zāles /
Receptinis vaistas

Eesti

Latvija

Lietuva

5017426/3-2110

Remodulin® 5 mg/ml ^{EE}
infusiooni/infuzijām Treprostinilum

1 ml infusiooni/infuzijām sisaldab 5 mg treprostinili (treprostinilnaatriumina).

Ainult subkutaanseks või intravenoosseks püsiinfusiooniks (kehavälise või implanteeritava infusioonipumbaga).

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Avatud vialit sisu tuleb ära kasutada 30 päeva jooksul. Subkutaanse püsiinfusiooni korral tuleb üks lahjendatav Remodulin'i mahuti (süstal) ära kasutada 72 tunni jooksul. Intravenoosse püsiinfusiooni korral tuleb üks lahjendatav Remodulin'i mahuti (süstal) ära kasutada 24 tunni jooksul. Intravenoosse püsiinfusiooni korral implanteeritava infusioonipumbaga tuleb lahjendatav Remodulin'i lahus ära kasutada 35 päeva jooksul. Üks 20 ml vialit sisaldab 100 mg treprostinili (treprostinilnaatriumina). Sisaldab naatriumi. Lisateavet vt pakendi infoleht. Abiained: naatriumsitraat, naatriumkloriid, naatriumhüdroksiid, vesinikkloriidhape, metakresool ja süstevesi.

Remodulin® 5 mg/ml ^{LV}
šķidums infūzijām Treprostinilum

1 ml infūziju šķīduma satur 5 mg treprostinilu (treprostinila nātrija sāli).

Tikai nepārtrauktu subkutānu infūziju vai nepārtrauktu intravenozu infūziju veidā (ārējs vai implantējams sūknis).

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Izniciniet flakonu 30 dienu laikā pēc pirmās atvēršanas. Nepārtrauktas subkutānas infūzijas gadījumā vienu neatšķaidītā Remodulin rezervuāru (šļirci) jāievada 72 stundu laikā. Nepārtrauktas intravenozas infūzijas gadījumā vienu atšķaidītā Remodulin rezervuāru (šļirci) jāievada 24 stundu laikā. Nepārtrauktas intravenozas infūzijas gadījumā, izmantojot implantējamo sūkni, atšķaidīts Remodulin jāizlieto 35 dienu laikā. Viens 20 ml flakons satur 100 mg treprostinila, treprostinila nātrija sāls veidā. Satur nātriju. Papildu informācijai skatīt lietošanas instrukciju. Citas sastāvdaļas (kā palīgvielas): nātrija citrāts, nātrija hlorīds, nātrija hidroksīds, sāļsskābe, metakrezols un ūdens injekcijām.

PC:
SN:

Lot:
Exp:

Ūks 20 ml viaal sisaldab 100 mg treprostiniili (treprostiniilnatriumina). Ainult subkutaansesks või intravenoosesseks püsinfusiooniks (kehavälise või implanteeritava infusioonipumbaga).

Viens 20 ml flakons satur 100 mg treprostiniila, treprostiniila natrija saaks veidä. Tikai nepärtraaktu subkutaanu infuziju vai nepärtraaktu intravenozu infuziju veidä (ärejs vai implantējams süknis).

Vienäme 20 ml butelike yra 100 mg treprostiniilo (treprostiniilo natrio druskos pavidaals). Vartoti tik nuclätinäs infuzijäs po oda arba į veną (šoriniu arba implantuojamuju siurbiu) būdu.

Remodulin[®]
5 mg/ml

**infusioonilahas/
šķidums infūzijām/
infuzinis tirpalas**

Treprostinilum
20 ml

401742720-2109

Müügloa holdja /
Reģistrācijas apliecbas īpašnieks /
Reģistratojas:
Ferrer Internacional, S.A.

Lot: EXP: