



Remodulin[®] 10 mg/ml ^{LT}
infuzinis tirpalas Treprostinilum

1 ml infuzinio tirpalo yra 10 mg treprostinilio (treprostinilio natrio druskos pavidalu).

Vartoti tik nuolatinės infuzijos po oda arba į veną (išoriniu arba implantuojamuoju siurbliu) būdu.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Po pirmojo buteliuko atidarymo praėjus 30 dienų jį sunaikinkite.

Nuolatinės infuzijos po oda metu vieną neskiesto Remodulin talpyklę (svirkštą) reikia suvartoti per 72 valandas.

Nuolatinės infuzijos į veną metu vieną praskiesto Remodulin talpyklę (svirkštą) reikia suvartoti per 24 valandas.

Nuolatinės infuzijos į veną naudojant implantuojamuosius infuzijos siurblius metu praskiestą Remodulin reikia suvartoti per 35 dienas.

Viename 20 ml buteliuke yra 200 mg treprostinilio (treprostinilio natrio druskos pavidalu). Sudėtyje yra natrio. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje. Sudėtyje taip pat yra šių pagalbinių medžiagų: natrio citrato, natrio chlorido, natrio hidroksido, vandenilio chlorido rūgšties, metakrezolio ir injekcinio vandens.

Müügiloa hoidja / Reģistrācijas apliecības īpašnieks / Reģistratojas:

Ferrer Internacional, S.A.
 Gran Vía Carlos III, 94
 08028 – Barcelona
 Hispaania / Spānija / Ispanija **20 ml**

Müügiloa nr: 504605
Reģ Nr.: 07-0204
 LT/1/07/0903/004

Retseptiravim /
 Receptu zāles /
 Receptinis vaistas

Eesti	
Latvija	
Lietuva	

Remodulin[®] 10 mg/ml ^{EE}
infusiooniļahus Treprostinilum

1 ml infusiooniļahust sisaldab 10 mg treprostinili (treprostinilnaatriumina).

Ainult subkutaanseks või intravenosseks püsiinfusiooniks (kehavälise või implanteeritava infusioonipumbaga).

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Avatud vialii sisu tuleb ära kasutada 30 päeva jooksul.

Subkutaanse püsiinfusiooni korral tuleb üks lahjendatav Remodulin'i mahuti (süstal) ära kasutada 72 tunni jooksul.

Intravenosse püsiinfusiooni korral tuleb üks lahjendatav Remodulin'i mahuti (süstal) ära kasutada 24 tunni jooksul.

Intravenosse püsiinfusiooni korral implanteeritava infusioonipumbaga tuleb lahjendatav Remodulin'i lahus ära kasutada 35 päeva jooksul.

Üks 20 ml vialil sisaldab 200 mg treprostinili (treprostinilnaatriumina). Sisaldab naatriumi.

Lisateavet vt pakendi infoleht.

Abiained: naatriumsitraat, naatriumkloriid, naatriumhüdroksiid, vesinikkloriidhape, metakresool ja süstevesi.

Remodulin[®] 10 mg/ml ^{LV}
šķīdums infūzijām Treprostinilum

1 ml infūziju šķīduma satur 10 mg treprostinilu (treprostinila nātrija sāli).

Tikai nepārtrauktu subkutānu infūziju vai nepārtrauktu intravenozu infūziju veidā (ārējs vai implantējams sūkņis).

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Iznīciniet flakonu 30 dienu laikā pēc pirmās atvēršanas.

Nepārtrauktas subkutānas infūzijas gadījumā vienu neatskāidītā Remodulin rezervuāru (šļirci) jāievada 72 stundu laikā.

Nepārtrauktas intravenozas infūzijas gadījumā vienu atšķaidīta Remodulin rezervuāru (šļirci) jāievada 24 stundu laikā.

Nepārtrauktas intravenozas infūzijas gadījumā, izmantojot implantējamo sūkni, atšķaidīts Remodulin jāizlieto 35 dienu laikā.

Viens 20 ml flakons satur 200 mg treprostinila, treprostinila nātrija sāls veidā. Satur nātriju. Papildu informācijai skatīt lietošanas instrukciju.

Citas sastāvdaļas (kā palīgvielas): nātrija citrāts, nātrija hlorīds, nātrija hidroksīds, sāļsskābe, metakrezols un ūdens injekcijām.

5017433/3-2110

PC:
 SN:
 Lot:
 Exp:

Ūks 20 ml vialā satur 200 mg treprostīnīli (treprostīnīlnātrīna sāļi). Atļauts subkutānsks vai intravenozsks pūsinfusioonsks (kehvālīse vai implanēeritava infusioonipumbaga).

Viens 20 ml flakons satur 200 mg treprostīnīli, treprostīnīli nātrīja sāļi veidā. Tikai nepārtrauktu subkutānu infūziju vai nepārtrauktu intravenozu infūziju veidā (ārējs vai implanēējams sūknis).

Vienā 20 ml butelīke ir 200 mg treprostīnīli (treprostīnīli nātrīja sāļi veidā). Vartoti tik nuāstīnīs infūzījās po odu arba j venā (īsoīnu arba implanēojamuju sūknī) būdu.

Remodulin[®]
10 mg/ml

**infusioonīlahus/
šķīdums infūzījām/
infuzīnīs tīrpals**

Treprostīnīlums
20 ml

5017431/2-2106

Mūuglīka hoidja /
Regīstrācijas aplīebības īpašnīeks /
Regīstratōojas:
Ferrer Internacīonal S.A.

Lot: EXP: