



132904-4

1 ml infusioonilahuse kontsentratt sisaldab 281 mikrogrammi tirofibaanvesinikkloriidmonohidraati, mis vastab 250 mikrogrammile tirofibaanile.
Abiained:
Natrii chloridum, Natrii citras dihydricus, Acidum citricum anhydricum, Aqua ad iniectionabile, Acidum hydrochloridum/Natrii hydroxidum (pH reguleerimiseks).
Intravenoosne (pärast lahjendamist).

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoiatus: Kasutada võib vaid selget, värvitut lahust, mis on avamata viaalis. Mitte lasta külmuda. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Aggrastat infusioonilahuse kontsentratt tuleb enne kasutamist lahjendada. Manustada kalibreeritud infundeerimisvahendide kasutades.

Retseptiravim.

Müügiloa nr: 238398

Correvio
15 rue du Bicentenaire
92800 Puteaux
Prantsusmaa / Prancúzija / Francia

Viens ml koncentrata infuziju skiduma pagatavosanal satur 281 mikrogramu tirofibaana hidrochlorida monohidraata, kas atbilst 250 mikrogramiem tirofibaana.

Paligvielas:
natrii chloridum, natrii citras dihydricus, acidum citricum anhydricum, aqua ad iniectionabilia, acidum hydrochloridum/natrii hydroxidum (pH pielagošanai).
Intravenozai lietošanai (pirms lietošanas atskaidrit).
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Brīdinājums: Nelietojiet Aggrastat, ja pirms lietošanas pamanāt redzamas daļiņas vai arī šķidums ir mainījis krāsu.
Nesasadēt. Uzglabāt flakonu oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Aggrastat koncentrats infuziju skiduma pagatavosanal pirms lietošanas jāatšaidita. Ievadišanai ieteicams izmantot kalibrētu infuziju aprikojumu.
Recepšu zāles.

Reg.Nr.: 99-0206



7 640160 350312 >

AGGRASTAT

250 mikrogrammi/ml infusioonilahuse kontsentratt/
250 mikrogrammi/ml koncentrats infuziju skiduma pagatavosanal/
250 mikrogramu/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Tirofibanum

Infusioonilahuse kontsentratt
1 viaal 50 ml

Koncentrats infuziju skiduma pagatavosanal
1 flakons 50 ml

Koncentratas infuziniam tirpalui
1 flakonas 50 ml

correvio

AGBP0203-081019-02

1 ml koncentrato infuziniam tirpalui yra 281 mikrogramas tirofibaano hidrochlorido monohidrata, atitinkančio 250 mikrogramų tirofibaano.

Pagalbinės medžiagos:
Natrii chloridum, Natrii citras dihydricus, Acidum citricum anhydricum, Aqua ad iniectionabilia, Acidum hydrochloridum concentratum/Natrii hydroxidum (pH reguliuoti).

Leisti į veną (tik prieš tai atskiedus).

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Perspėjimas: naudokite tik skaidrų, bespalvį sterilių koncentratą, kuris yra nepažeistame flakone. Negalima užšaldyti.

Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Receptinis vaistas.

LT/1/98/0081/001

AGBP0203-081019-02

50 x 50 x 85

PC 07640160350312

S/N: NNNNNNNNNNNN
Kõiblik kuni/EXP: MM/YY
Tirika iik: MM/YY
Partii nr/Lot/Serija: XXXXAB



AGGRASTAT®

250 mikrogrammi/ml infusioonilahuse

konsentraat

250 mikrogrami/ml koncentrats infūziju šķīduma

pagatavošanai

250 mikrogramu/ml koncentratas infuziniam

tirpalui

Tirofibanum

50 ml

correvio

192976-4

AGRP0201-240519-00

Intravenoosa lietošanai (tikai pēc

ārsta ieteikuma)

Pirms izņemšanas no iepakojuma

notiek pārbaude, lai noteiktu

originalpakotē, vai gūse esat katšult.

Intravenoza lietošanai (tikai pēc

ārsta ieteikuma)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas

instrukciju.

Nesasūdi. Uzglabāt flakonu oriģinālā

repaģijūnā, lai pasargātu no gaismas.

Lietajiet vienā (tik rīnēš tai atskēdus)

Priēš vertojima perskatijūkite pakotēs lapell.

Nēgalima uzšaldijūt. Flakonu laikijūt išornēje

deziūteje, kad valetas būj apsaugotas nuo

svieses.

Correvio

Correvio

Correvio