

0,6 ml


**Fraxiparine<sup>®</sup>**

5700 anti-Xa TV/0,6 ml injekcinis tirpalas  
nadroparino kalcio druska

0,6 ml

**Fraxiparine<sup>®</sup>**

5700 anti-Xa TV/0,6 ml injekcinis tirpalas  
nadroparino kalcio druska



10 užpildytų  
švirkštų

0,6 ml



0,6 ml

**Fraxiparine<sup>®</sup>**

5700 anti-Xa TV/0,6 ml injekcinis tirpalas  
nadroparino kalcio druska

**Lygiagretus importuotojas:**

UAB „Nemuno vaistinė“  
9-ojo Forto g. 70  
LT-48179 Kaunas  
Lietuva

**Gamintojas:**

Aspen Notre Dame de Bondeville  
1, rue de l'Abbaye  
76960 Notre Dame de Bondeville  
Prancūzija

arba

Chinion Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.  
Csanyikvölgy P.O.B. 565  
3510 Miskolc HU  
Vengrija

Perpakavo UAB „Entafarma“



PC:  
SN:  
Lot:  
EXP:

f r a x i p a r i n e

# 5 7 0 0



Kiekviename užpildytame švirkšte (0,6 ml) yra 5700 anti-Xa TV nadroparino kalcio druskos. Pagalbinės medžiagos: kalcio hidroksido tirpalas arba praskiesta vandenilio chlorido rūgštis pH koreguoti (nuo 5 iki 7,5) ir injekcinis vanduo.

Leisti po oda arba į veną, arba į arteriją. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Receptinis vaistas. LT/L///

*Lygiagrečiai importuojamas vaistinis preparatas skiriasi nuo referencinio vaistinio preparato išvaizda: nėra nurodytos lygiagrečiai importuojamo vaisto savybės, referencinis – skaidrus, ar šiek tiek opalinis, bespalvis arba šviesiai ar tamsiai gelsvas, arba šviesiai rusvas injekcinis tirpalas; laikymo sąlygomis: lygiagrečiai importuojamą vaistą laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, referencinį – laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje, gamintojo pakuotėje, neatšaldyti, nes šalta injekcija gali būti skausminga.*