

BCG-medac

intravesikaalsuspensiooni pulber ja lahusti

Pärast lahustamist sisaldab üks vial 2 x 10⁸... 3 x 10⁸ elusbakteri ühikut BCG (*Bacillus Calmette-Guérin*) bakteri RIVM tüve, mis on saadud 1173-P2 tüvest.

Abiained:

Pulber: polügeliiin, veevaba glükoos ja polisorbaat 80.

Lahusti: naatriumkloriid ja süstevesi.

Enne ravimist kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravesikaalsuspensiooni pulber ja lahusti.

1 vial pulbriga, 1 kott 50 ml lahustiga (0,9% NaCl).

Intravesikaalne.

Retseptiravim.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

pulveris un šķīdinātājs intravezikāli lietojamas suspensijas pagatavošanai

Bacillus Calmette-Guérin

Pēc atšķaidīšanas viens flakons satur: BCG (*Bacillus Calmette-Guérin*) baktēriju RIVM celmu, kas atvasināts no 1173-P2 celma

2 x 10⁸ līdz 3 x 10⁸ dzīvotspējīgas vienības.

Paligvielas:

Pulveris: poligēlīns, bezūdens glikoze, polisorbāts 80.

Šķīdinātājs: nātrija hlorīds un ūdens injekcijām.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Pulveris un šķīdinātājs intravezikāli lietojamas suspensijas pagatavošanai.

1 flakons ar pulveri, 1 maisis ar 50 ml šķīdinātāja (0,9% NaCl).

Intravezikāli lietošanai.

Recepšu zāles.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2 °C - 8 °C). Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Izmantotais materiāls vai neizlietotās zāles jāievieto klāt pievienotajā atkritumu maisā un jāiznīcina atbilstoši inficētu atkritumu iznīcināšanas kārtībai.

milteliai ir tirpiklis šļapimo pūslēs suspensijai

Po paruošimo viename flakone yra ne mažiau kaip 2 x 10⁸ ir ne daugiau kaip 3 x 10⁸ gyvybingų BCG (*Bacillus Calmette-Guérin*) bakterijų, RIVM padermės, išvestos iš 1173-P2.

Pagalbinės medžiagos:

milteliai: poligelinas, bevandenė gliukozė, polisorbatas 80.

tirpiklis: natrio chloridas, injekcinis vanduo.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Milteliai ir tirpiklis šļapimo pūslēs suspensijai

1 flakonas su miltelīais, 1 maišelis su 50 ml tirpiklio (0,9 % NaCl)

Vartoti j šļapimo pūslē.

Receptinis vaistas.

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti šaldytuve (2 °C - 8 °C). Negalima užšaldyti.

Flakoną laikyti gamintojo pakuoteje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Užterštas medžiagas ar nesuvargotą kiekį reikia sudėti į pakuoteje esantį maišą ir tinkamai išmesti kaip infekcinės atliekas.

medac GmbH
Theaterstr. 6
22880 Wedel
Saksamaa / Vācija / Vokietija

80161-VA304
12.24
AA

BCG-medac

Intravesikaalsuspensiooni pulber ja lahusti
pulveris un šķīdinātājs intravezikāli lietojamas suspensijas pagatavošanai
milteliai ir tirpiklis šļapimo
pūslēs suspensijai



BCG-medac

intravesikaalsuspensiooni pulber ja lahusti
pulveris un šķīdinātājs intravezikāli lietojamas suspensijas pagatavošanai
milteliai ir tirpiklis šļapimo pūslēs suspensijai



Partii number: / Sērija / Serija
Kōblīk kuni: / Derīgs līdz / Tinka iki

 Mūūgīloa number: 418503

 Reģ.Nr. 03-0304

 LT/1/03/2813/001

medac


medac

BCG-medac

intravesikaalsuspensiooni pulber ja lahusti
pulveris un šķīdinātājs intravezikāli lietojamas suspensijas pagatavošanai
milteliai ir tirpiklis šļapimo
pūslēs suspensijai

medac






FRONT PAGE

BACK PAGE

top left

<p>Parti nr: Serija Tinka i:</p> <p>Kalibrs, kuni: Deris rindz Serija</p>	<p>EE BCG-medac intravesikaalsuspensiooni pulber Intravesikaalne. Pärast lahustamist sisaldab üks vial 2 x 10⁸... 3 x 10⁹ elusbakteri ühikut BCG (<i>Bacillus Calmette-Guérin</i>) bakteri RIVM tüve, mis on saadud 1173-P2 tüvest. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.</p> <p>medac GmbH Theaterstr. 6 · 22880 Wedel · Saksamaa / Vācija / Vokietija</p>	<p>Ava siit Atvērt šeit / Atidaryti čia</p>	<p>LV BCG-medac pulveris intravezikāli lietojamas suspensijas pagatavošanai Bacillus Calmette-Guerin</p> <p>Pēc atšķaidīšanas viens flakons satur: BCG (<i>Bacillus Calmette-Guérin</i>) baktēriju RIVM celmu, kas atvasināts no 1173-P2 celma.....2 x 10⁸ līdz 3 x 10⁹ dzīvotspējīgas vienības. Palīgvielas: poligelīns, bezūdens glikoze, polisorbāts 80. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Pulveris intravezikāli lietojamas suspensijas pagatavošanai. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.</p>	 <p>80161-VE3K4 02.23 AA</p>
---	--	---	---	--

bottom left

BACK PAGE

FRONT PAGE

front page top left

<p>LT BCG-medac mitteliai šlapimo pūslės suspensijai</p> <p>Mittelius ištirpinus, viename flakone yra ne mažiau kaip 2 x 10⁸ ir ne daugiau kaip 3 x 10⁹ gyvybingų BCG (<i>Bacillus Calmette-Guerin</i>) bakterijų, RIVM padermės, išvestos iš 1173-P2.</p> <p>Pagalbinės medžiagos: poligelinas, bevandenė gliukozė, polisorbatas 80. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Mitteliai šlapimo pūslės suspensijai. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.</p>	<p>front page bottom left</p>
--	-------------------------------

FRONT PAGE

BACK PAGE



BACK PAGE

FRONT PAGE

