Carton - BOTOX® 200U - Estonia, Latvia, Lithuania

200 ALLERGANI ÜHIKUT /
200 ALLERGAN VIENĪBAS /
200 ALLERGAN VIENETŲ

93251EE

BOTOX®

200 Allergani ühikut, süstelahuse pulber / 200 Allergan vienības pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai / 200 Allergan vienetų milteliai injekciniam tirpalui

A-tüüpi *C. botulinum*'i toksiin / *Toxinum botulinicum A* / A tipo botulino toksinas

Üks viaal sisaldab 200 Allergani ühikut* A-tüüpi *botulinum* toksiini (saadud bakterist *Clostridium botulinum*). / Viens flakons satur 200 Allergan vienības* A tipa botulīna toksīna (no Clostridium botulinum). / Viename flakone yra 200 Allergan vienetų* A tipo botulino toksino (iš *Clostridium botulinum*).

BOTOX®

200 Allergani ühikut, süstelahuse pulber / 200 Allergan vienības pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai / 200 Allergan vienetų milteliai injekciniam tirpalui

A-tüüpi *C. botulinum*'i toksiin / *Toxinum botulinicum A* / A tipo botulino toksinas

Üks viaal sisaldab 200 Allergani ühikut* A-tüüpi *botulinum* toksiini (saadud bakterist *Clostridium botulinum*). / Viens flakons satur 200 Allergan vienības* A tipa botulīna toksīna (no Clostridium botulinum). / Viename flakone yra 200 Allergan vienetų* A tipo botulino toksino (iš *Clostridium botulinum*).

ALLERGAN®

PC 05016007205374

Partii nr:/
Sēr./
Serija:

Kõlblik kuni:/
Derīgs līdz:/
Tinka iki:

SN:

Inimalbumiin, naatriumkloriid.

Süstelahuse pulber
1 viaal

Intramuskulaarne või intradermaalne.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**Botulinum* toksiini ühikud ei ole teiste preparaatide puhul asendatavad.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist on soovitatav lahuse kohene kasutamine, kuigi seda võib ka hoida kuni 24 tundi külmkapis (2°C...8°C).

Hoida külmkapis (2°C...8°C) või sügavkülmas (–5°C…–20°C).

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada kohalike nõuete kohaselt.

Müügiloa nr: 743911

Retseptiravim.

5 016007 205374 >

66593EE11

Cilvēka albumīns, nātrija hlorīds

Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai
1 flakons

Intramuskulārai un intradermālai lietošanai.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

*Botulīna toksīna vienības nav savstarpēji aizstājamas no viena izstrādājuma citā.

Pēc sagatavošanas šķīdumu ieteicams izlietot nekavējoties, tomēr to ne ilgāk kā 24 stundas var uzglabāt ledusskapī (2°C – 8 °C).

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8 °C temperatūrā) vai saldētavā (-5 °C - -20°C temperatūrā).

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

15-0295

Recepšu zāles.

® marks owned by Allergan, Inc.
© 2019 Allergan, Inc., Irvine, CA 92612

Žmogaus albuminas, natrio chloridas.

Milteliai injekciniam tirpalui
1 flakonas

Leisti į raumenis ir į odą.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

* Vieno vaisto botulino toksino vienetų negalima taikyti kitiems vaistams.

Paruoštą tirpalą rekomenduojama vartoti nedelsiant; tačiau tirpalą iki 24 val. galima laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C).

Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C) arba šaldiklyje (nuo –5 °C iki –20 °C).

Nesuvartotą vaistą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

LT/1/15/3824/011

Receptinis vaistas.

ALLERGAN®
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport
Co. Mayo
Airimaa/Īrija/Airija

ARTWORK TEMPLATE 0308207