



EXP
Lot

LT
L890621 02

Maxitrol®



Vartoti ant akių. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Pirmą kartą atidarius buteliuką, suspensijos tinkamumo laikas - 28 dienos. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Negalima šaldyti. Buteliuką laikyti stačią. Buteliuką laikyti sandarų. Receptinis vaistas.



Maxitrol®

akių lašai (suspensija)

*deksametazonas,
neomicino sulfatas,
polimiksino B sulfatas*

5 ml

 **NOVARTIS**

1 ml suspensijos yra 1 mg deksametazono, 3500 TV neomicino sulfato ir 6000 TV polimiksino B sulfato. *Natrii chloridum, polysorbatum 20, benzalkonii chloridum, hypromellosum, acidum hydrochloridum et/aut natrii hydroxidum, aqua purificata.*

LT/1/92/2087/001

SIA Novartis Baltics
Skanstes iela 25
LV-1013, Rīga
Latvija

PC: 07613421036911





5 ml

Dexamethasonum/
Neomycini sulfas/
Polymyxini B sulfas

Vartoti ant akių.

Prieš vartojimą perskaitykite
pakuoės lapelį.

 **Maxitrol**[®]
akių lašai (suspensija)

451391 LT

Lot/EXP

