



EXP  
Lot

L852240 02  
R07

**Tobradex®**  
3 mg/1 mg/ml

Okulaarne  
**Enne kasutamist  
loksutada.**  
Enne ravimi kasutamist  
lugege pakendi infolehte.  
1 ml suspensiooni  
sisaldab 3 mg  
tobramüttsiini ja  
1 mg deksametasooni.  
Hoida laste eest varjatud  
ja kättesaamatus kohas.  
Hoida temperatuuril kuni  
25 °C. Mitte lasta  
külmuda. Hoida pudel  
tihealt suletuna. Hoida  
pudel püstises asendis.  
**Hävitada 4 nädalat  
pärast esmast avamist.**

Receptiravim  
EE 199998

Avatud:  
Atverts:  
Atidaryta:

Okulārai lietošanai  
**Pirms lietošanas sakratīt.**  
Pirms lietošanas izlasiet  
lietošanas instrukciju.  
1 ml suspensijas satur  
3 mg tobramicina un  
1 mg deksametazona.  
Uzglabāt bērniem  
neredzamā un nepieejamā  
vietā.  
Uzglabāt temperatūrā līdz  
25°C.  
Nesaldēt.  
Uzglabāt cieši noslēgtā  
iepakojumā. Uzglabāt  
vertikālā stāvoklī.  
**Iepakojums jāizmet  
4 nedēļas pēc pirmās  
atvēršanas.**

Recepšu zāles.  
LV Reģ. Nr.: 99-1058

SIA Novartis Baltics  
Skanstes iela 25  
LV-1013, Rīga  
Lāti/Latvija



NOVARTIS

Vartoti ant akių.  
**Prieš vartojant, talpyklę  
reikia gerai supluoti.**  
Prieš vartojimą perskaitykite  
pakuotės lapelį.  
1 ml suspensijos yra  
3 mg tobramicino ir  
1 mg deksametazono.  
Laikyti vaikams nepastebimoje  
ir nepasiekiamoje vietoje.  
Laikyti ne aukštesnėje kaip  
25 °C temperatūroje.  
Negalima užšaldyti.  
Talpyklę laikyti stačia.  
Talpyklę laikyti sandariai.  
**Pirmą kartą atidarius  
talpyklę, suspensijos  
tinkamumo laikas –  
4 savaitės.**

Receptinis vaistas.  
LT/1/2000/1352/001

**Abiained/Paligvielas/  
Pagalbinės medžiagos:**  
*benzalkonii chloridum, dinatrii  
edetas, natrii chloridum, natrii  
sulphas anhydricus, tyloxapolum,  
hydroxyethylcellulosum,  
acidum sulfuricum et/aut natrii  
hydroxidum, aqua purificata.*

PC 07613421167868



