COLDREX HotRem
LEMON
CITRINŲ SKONIO SIDRUNIMAITSELINE AR CITRONA GARŠU
INDIKACIJOS / NĀIDUSTUSED / INDIKĀCIJAS
Trumpalaikis peršalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, slogos ir skausmo) lengvinimas / Lühiajaline palaviku alandamine, nõrga valu leevendamine ja nohu sümptomaatiline ravi / Gripas un saaukstēšanās simptomu īslaicīgai atvieglošanai (drudzis, drebuļi, sāpes).
DOZAVIMAS / ANNUSTAMINE / DEVAS
LT Suaugusiems žmonėms (įskaitant senyvus) ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: vieno paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje karšto vandens ir gerti kas 4–6 val., bet ne daugiau kaip 5 paketėlius per 24 val. Negalima dozės gerti dažniau nei kas 4 valandas.
Vaikams iki 12 metų vaisto vartoti negalima.
Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Negalima viršyti nurodytos dozės. Nevartokite su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio, vaistais, kurie mažina gleivinės paburkimą arba vaistais peršalimui gydyti.
EST Täiskasvanud (sealhulgas eakad patsiendid) ja üle 12-aastased lapsed: tühjendage ühe pakikese sisu tassi, lisage kuuma vett ja jooge iga 4 - 6 tunni järel, aga mitte rohkem kui 5 pakikest 24 tunni jooksul. Ärge võtke sagedamini kui iga 4 tunni järel.
Ärge andke ravimit alla 12-aastastele ilma arsti soovituseta.
Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Ärge ületage ettenähtud annust. Ärge kasutage koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega või muude ravimitega, mis on mõeldud kõha ja külmetuse või ninakinnisuse leevendamiseks.
LV Pieaugušajiem (arī gados vecākiem cilvēkiem) un bērniem no 12 gadu vecuma: vienas paciņas saturu ieberiet krūzē ar karstu ūdeni un lietojiet reizi 4 – 6 stundās, bet ne vairāk par 5 paciņām 24 stundu laikā. Nelietot biežāk kā reizi 4 stundās.
Bērniem līdz 12 gadu vecumam: nav ieteicams.
Iekšķīgai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nepārsniegt ieteiktās devas. Nelietot vienlaikus ar citām zālēm, kas satur paracetamolu, vai ar zālēm, kas mazina saaukstēšanās, gripas un aizlikta deguna simptomus.
10 paketėlių
10 pakiknest
10 paciņas
11000010003819
Feed Direction
CT10512A
Registruotojas / Ettevõtja / Reģistrētājs / Registrant:
Richard Bittner AG
Reisnerstraße 55-57, A-1030 Wien
Austria/ Austria/ Austrija
4 742041 002792
OMEGA BITTNER
Paracetamolum/
Phenylephrini hydrochloridum/
Acidum ascorbicum
Viename paketėlyje (5 g) yra 750 mg paracetamolio, 10 mg fenilefrino hidrochlorido ir 50 mg askorbinės rūgšties.
Sudėtyje yra saharozės ir natrio. Daugiau informacijos – vartojimo instrukcijoje.
25°C temperatūroje. Nereceptinis vaistinis preparatas. 10 dienų tinkamumo laikas po pakuotės atidarymo.
EST Üks pakike (5 g) sisaldab 750 mg paratsetamooli, 10 mg fenüülefriinhüdrokloriidi ja 50 mg askorbiinhapet.
Sisaldab sahharoosi ja naatriumi. Lisainfo leiab pakendi infolehest. Hoida temperatuuril 25°C.
Käsimüügiravim. Müügiloa nr. 125196
LV Katra paciņa (5 g) satur 750 mg paracetamola, 10 mg fenilefrīna hlorīda un 50 mg askorbīnskābes.
Saharozi un nātriju. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Bezrecepšu zāles. LV Reģ. Nr.: 98-0859
Serija/ Partii nr/ Sērija:
Tinka iki/ Kõlblik kuni/
Derīgs līdz:


Feed Direction

Unwind sense / Sentido de salida

COLDREX HOTREM

750 mg/ 10 mg/ 60 mg

LEMON

5 g

Mitelski gerenamjen trjaluć/
suuksuośe lânse ijubev/
Puhemisjen lõõgõõ leõõmsa sijõõma gaejaavõõsenal

Pharmaceutical form:
Phmyhpirtim hydrochloridum/
Acidum ascorbicum

OMEGA BITTER

Vartoti per burną/ Suukuodne/ lekštojai lietuviai

DOZAVIMAS:
Suaugusiems žmonems (įskaitant senyvus) ir vyresniems kaip 12 metų vaikams vieno paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje karšto vandens ir geriti kas 4–6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 paketėlius per 24 val. Nepašlima dozės geriti dažniau nei kas 4 valandas.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Ilgesnę laiką kartojamai kuprojo pakendi infektite.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Richard Bittner AG

ANNUSTAMINE:
Tõõkõõsnuõl (suõlhõõs eskad patsiendid) ja õõ 12-aastased lapsed: tõõhpõõdõõ õõe pakõõse sisu tassi, õõage kuõma vett ja joogõõ igaa 4–6 tunni järel, aga mittõõ rohkem kui 5 pakõõnõõ 24 tunni jooksul. Õõge võõte sagedammin kui igaa 4 tunni järel.

DEVAS:
Pieaugušajiem (ar gados vecākiem cilvēkiem) un bērniem no 12 gadu vecuma: vienas paciņas satura ieberet krūzē ar karstu ūdeni un lietojiet reizi 4–6 stundās, bet ne vairāk par 5 paciņām 24 stundu laikā. Nelietot biežāk ka reizi 4 stundās.

1100001000387 SA10514A

Lot
EXP

1

Vartoti per burną/ Suukuodne/ lekštojai lietuviai

DOZAVIMAS:
Suaugusiems žmonems (įskaitant senyvus) ir vyresniems kaip 12 metų vaikams vieno paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje karšto vandens ir geriti kas 4–6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 paketėlius per 24 val. Nepašlima dozės geriti dažniau nei kas 4 valandas.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Ilgesnę laiką kartojamai kuprojo pakendi infektite.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Richard Bittner AG

ANNUSTAMINE:
Tõõkõõsnuõl (suõlhõõs eskad patsiendid) ja õõ 12-aastased lapsed: tõõhpõõdõõ õõe pakõõse sisu tassi, õõage kuõma vett ja joogõõ igaa 4–6 tunni järel, aga mittõõ rohkem kui 5 pakõõnõõ 24 tunni jooksul. Õõge võõte sagedammin kui igaa 4 tunni järel.

DEVAS:
Pieaugušajiem (ar gados vecākiem cilvēkiem) un bērniem no 12 gadu vecuma: vienas paciņas satura ieberet krūzē ar karstu ūdeni un lietojiet reizi 4–6 stundās, bet ne vairāk par 5 paciņām 24 stundu laikā. Nelietot biežāk ka reizi 4 stundās.

1100001000387 SA10514A

Lot
EXP

2

Vartoti per burną/ Suukuodne/ lekštojai lietuviai

DOZAVIMAS:
Suaugusiems žmonems (įskaitant senyvus) ir vyresniems kaip 12 metų vaikams vieno paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje karšto vandens ir geriti kas 4–6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 paketėlius per 24 val. Nepašlima dozės geriti dažniau nei kas 4 valandas.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Ilgesnę laiką kartojamai kuprojo pakendi infektite.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Richard Bittner AG

ANNUSTAMINE:
Tõõkõõsnuõl (suõlhõõs eskad patsiendid) ja õõ 12-aastased lapsed: tõõhpõõdõõ õõe pakõõse sisu tassi, õõage kuõma vett ja joogõõ igaa 4–6 tunni järel, aga mittõõ rohkem kui 5 pakõõnõõ 24 tunni jooksul. Õõge võõte sagedammin kui igaa 4 tunni järel.

DEVAS:
Pieaugušajiem (ar gados vecākiem cilvēkiem) un bērniem no 12 gadu vecuma: vienas paciņas satura ieberet krūzē ar karstu ūdeni un lietojiet reizi 4–6 stundās, bet ne vairāk par 5 paciņām 24 stundu laikā. Nelietot biežāk ka reizi 4 stundās.

1100001000387 SA10514A

Lot
EXP

3

Vartoti per burną/ Suukuodne/ lekštojai lietuviai

DOZAVIMAS:
Suaugusiems žmonems (įskaitant senyvus) ir vyresniems kaip 12 metų vaikams vieno paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje karšto vandens ir geriti kas 4–6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 paketėlius per 24 val. Nepašlima dozės geriti dažniau nei kas 4 valandas.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Ilgesnę laiką kartojamai kuprojo pakendi infektite.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Richard Bittner AG

ANNUSTAMINE:
Tõõkõõsnuõl (suõlhõõs eskad patsiendid) ja õõ 12-aastased lapsed: tõõhpõõdõõ õõe pakõõse sisu tassi, õõage kuõma vett ja joogõõ igaa 4–6 tunni järel, aga mittõõ rohkem kui 5 pakõõnõõ 24 tunni jooksul. Õõge võõte sagedammin kui igaa 4 tunni järel.

DEVAS:
Pieaugušajiem (ar gados vecākiem cilvēkiem) un bērniem no 12 gadu vecuma: vienas paciņas satura ieberet krūzē ar karstu ūdeni un lietojiet reizi 4–6 stundās, bet ne vairāk par 5 paciņām 24 stundu laikā. Nelietot biežāk ka reizi 4 stundās.

1100001000387 SA10514A

Lot
EXP

4

Vartoti per burną/ Suukuodne/ lekštojai lietuviai

DOZAVIMAS:
Suaugusiems žmonems (įskaitant senyvus) ir vyresniems kaip 12 metų vaikams vieno paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje karšto vandens ir geriti kas 4–6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 paketėlius per 24 val. Nepašlima dozės geriti dažniau nei kas 4 valandas.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Ilgesnę laiką kartojamai kuprojo pakendi infektite.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Richard Bittner AG

ANNUSTAMINE:
Tõõkõõsnuõl (suõlhõõs eskad patsiendid) ja õõ 12-aastased lapsed: tõõhpõõdõõ õõe pakõõse sisu tassi, õõage kuõma vett ja joogõõ igaa 4–6 tunni järel, aga mittõõ rohkem kui 5 pakõõnõõ 24 tunni jooksul. Õõge võõte sagedammin kui igaa 4 tunni järel.

DEVAS:
Pieaugušajiem (ar gados vecākiem cilvēkiem) un bērniem no 12 gadu vecuma: vienas paciņas satura ieberet krūzē ar karstu ūdeni un lietojiet reizi 4–6 stundās, bet ne vairāk par 5 paciņām 24 stundu laikā. Nelietot biežāk ka reizi 4 stundās.

1100001000387 SA10514A

Lot
EXP

5

Vartoti per burną/ Suukuodne/ lekštojai lietuviai

DOZAVIMAS:
Suaugusiems žmonems (įskaitant senyvus) ir vyresniems kaip 12 metų vaikams vieno paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje karšto vandens ir geriti kas 4–6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 paketėlius per 24 val. Nepašlima dozės geriti dažniau nei kas 4 valandas.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Ilgesnę laiką kartojamai kuprojo pakendi infektite.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Richard Bittner AG

ANNUSTAMINE:
Tõõkõõsnuõl (suõlhõõs eskad patsiendid) ja õõ 12-aastased lapsed: tõõhpõõdõõ õõe pakõõse sisu tassi, õõage kuõma vett ja joogõõ igaa 4–6 tunni järel, aga mittõõ rohkem kui 5 pakõõnõõ 24 tunni jooksul. Õõge võõte sagedammin kui igaa 4 tunni järel.

DEVAS:
Pieaugušajiem (ar gados vecākiem cilvēkiem) un bērniem no 12 gadu vecuma: vienas paciņas satura ieberet krūzē ar karstu ūdeni un lietojiet reizi 4–6 stundās, bet ne vairāk par 5 paciņām 24 stundu laikā. Nelietot biežāk ka reizi 4 stundās.

1100001000387 SA10514A

Lot
EXP

6

Vartoti per burną/ Suukuodne/ lekštojai lietuviai

DOZAVIMAS:
Suaugusiems žmonems (įskaitant senyvus) ir vyresniems kaip 12 metų vaikams vieno paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje karšto vandens ir geriti kas 4–6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 paketėlius per 24 val. Nepašlima dozės geriti dažniau nei kas 4 valandas.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Ilgesnę laiką kartojamai kuprojo pakendi infektite.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Richard Bittner AG

ANNUSTAMINE:
Tõõkõõsnuõl (suõlhõõs eskad patsiendid) ja õõ 12-aastased lapsed: tõõhpõõdõõ õõe pakõõse sisu tassi, õõage kuõma vett ja joogõõ igaa 4–6 tunni järel, aga mittõõ rohkem kui 5 pakõõnõõ 24 tunni jooksul. Õõge võõte sagedammin kui igaa 4 tunni järel.

DEVAS:
Pieaugušajiem (ar gados vecākiem cilvēkiem) un bērniem no 12 gadu vecuma: vienas paciņas satura ieberet krūzē ar karstu ūdeni un lietojiet reizi 4–6 stundās, bet ne vairāk par 5 paciņām 24 stundu laikā. Nelietot biežāk ka reizi 4 stundās.

1100001000387 SA10514A

Lot
EXP

7

Vartoti per burną/ Suukuodne/ lekštojai lietuviai

DOZAVIMAS:
Suaugusiems žmonems (įskaitant senyvus) ir vyresniems kaip 12 metų vaikams vieno paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje karšto vandens ir geriti kas 4–6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 paketėlius per 24 val. Nepašlima dozės geriti dažniau nei kas 4 valandas.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Ilgesnę laiką kartojamai kuprojo pakendi infektite.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Richard Bittner AG

ANNUSTAMINE:
Tõõkõõsnuõl (suõlhõõs eskad patsiendid) ja õõ 12-aastased lapsed: tõõhpõõdõõ õõe pakõõse sisu tassi, õõage kuõma vett ja joogõõ igaa 4–6 tunni järel, aga mittõõ rohkem kui 5 pakõõnõõ 24 tunni jooksul. Õõge võõte sagedammin kui igaa 4 tunni järel.

DEVAS:
Pieaugušajiem (ar gados vecākiem cilvēkiem) un bērniem no 12 gadu vecuma: vienas paciņas satura ieberet krūzē ar karstu ūdeni un lietojiet reizi 4–6 stundās, bet ne vairāk par 5 paciņām 24 stundu laikā. Nelietot biežāk ka reizi 4 stundās.

1100001000387 SA10514A

Lot
EXP

8

Vartoti per burną/ Suukuodne/ lekštojai lietuviai

DOZAVIMAS:
Suaugusiems žmonems (įskaitant senyvus) ir vyresniems kaip 12 metų vaikams vieno paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje karšto vandens ir geriti kas 4–6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 paketėlius per 24 val. Nepašlima dozės geriti dažniau nei kas 4 valandas.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Ilgesnę laiką kartojamai kuprojo pakendi infektite.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Richard Bittner AG

ANNUSTAMINE:
Tõõkõõsnuõl (suõlhõõs eskad patsiendid) ja õõ 12-aastased lapsed: tõõhpõõdõõ õõe pakõõse sisu tassi, õõage kuõma vett ja joogõõ igaa 4–6 tunni järel, aga mittõõ rohkem kui 5 pakõõnõõ 24 tunni jooksul. Õõge võõte sagedammin kui igaa 4 tunni järel.

DEVAS:
Pieaugušajiem (ar gados vecākiem cilvēkiem) un bērniem no 12 gadu vecuma: vienas paciņas satura ieberet krūzē ar karstu ūdeni un lietojiet reizi 4–6 stundās, bet ne vairāk par 5 paciņām 24 stundu laikā. Nelietot biežāk ka reizi 4 stundās.

1100001000387 SA10514A

Lot
EXP

9

Vartoti per burną/ Suukuodne/ lekštojai lietuviai

DOZAVIMAS:
Suaugusiems žmonems (įskaitant senyvus) ir vyresniems kaip 12 metų vaikams vieno paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje karšto vandens ir geriti kas 4–6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 paketėlius per 24 val. Nepašlima dozės geriti dažniau nei kas 4 valandas.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Ilgesnę laiką kartojamai kuprojo pakendi infektite.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Richard Bittner AG

ANNUSTAMINE:
Tõõkõõsnuõl (suõlhõõs eskad patsiendid) ja õõ 12-aastased lapsed: tõõhpõõdõõ õõe pakõõse sisu tassi, õõage kuõma vett ja joogõõ igaa 4–6 tunni järel, aga mittõõ rohkem kui 5 pakõõnõõ 24 tunni jooksul. Õõge võõte sagedammin kui igaa 4 tunni järel.

DEVAS:
Pieaugušajiem (ar gados vecākiem cilvēkiem) un bērniem no 12 gadu vecuma: vienas paciņas satura ieberet krūzē ar karstu ūdeni un lietojiet reizi 4–6 stundās, bet ne vairāk par 5 paciņām 24 stundu laikā. Nelietot biežāk ka reizi 4 stundās.

1100001000387 SA10514A

Lot
EXP

10

Vartoti per burną/ Suukuodne/ lekštojai lietuviai

DOZAVIMAS:
Suaugusiems žmonems (įskaitant senyvus) ir vyresniems kaip 12 metų vaikams vieno paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje karšto vandens ir geriti kas 4–6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 paketėlius per 24 val. Nepašlima dozės geriti dažniau nei kas 4 valandas.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Ilgesnę laiką kartojamai kuprojo pakendi infektite.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Richard Bittner AG

ANNUSTAMINE:
Tõõkõõsnuõl (suõlhõõs eskad patsiendid) ja õõ 12-aastased lapsed: tõõhpõõdõõ õõe pakõõse sisu tassi, õõage kuõma vett ja joogõõ igaa 4–6 tunni järel, aga mittõõ rohkem kui 5 pakõõnõõ 24 tunni jooksul. Õõge võõte sagedammin kui igaa 4 tunni järel.

DEVAS:
Pieaugušajiem (ar gados vecākiem cilvēkiem) un bērniem no 12 gadu vecuma: vienas paciņas satura ieberet krūzē ar karstu ūdeni un lietojiet reizi 4–6 stundās, bet ne vairāk par 5 paciņām 24 stundu laikā. Nelietot biežāk ka reizi 4 stundās.

1100001000387 SA10514A

Lot
EXP

11

Vartoti per burną/ Suukuodne/ lekštojai lietuviai

DOZAVIMAS:
Suaugusiems žmonems (įskaitant senyvus) ir vyresniems kaip 12 metų vaikams vieno paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje karšto vandens ir geriti kas 4–6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 paketėlius per 24 val. Nepašlima dozės geriti dažniau nei kas 4 valandas.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Ilgesnę laiką kartojamai kuprojo pakendi infektite.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Richard Bittner AG

ANNUSTAMINE:
Tõõkõõsnuõl (suõlhõõs eskad patsiendid) ja õõ 12-aastased lapsed: tõõhpõõdõõ õõe pakõõse sisu tassi, õõage kuõma vett ja joogõõ igaa 4–6 tunni järel, aga mittõõ rohkem kui 5 pakõõnõõ 24 tunni jooksul. Õõge võõte sagedammin kui igaa 4 tunni järel.

DEVAS:
Pieaugušajiem (ar gados vecākiem cilvēkiem) un bērniem no 12 gadu vecuma: vienas paciņas satura ieberet krūzē ar karstu ūdeni un lietojiet reizi 4–6 stundās, bet ne vairāk par 5 paciņām 24 stundu laikā. Nelietot biežāk ka reizi 4 stundās.

1100001000387 SA10514A

Lot
EXP

12

Vartoti per burną/ Suukuodne/ lekštojai lietuviai

DOZAVIMAS:
Suaugusiems žmonems (įskaitant senyvus) ir vyresniems kaip 12 metų vaikams vieno paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje karšto vandens ir geriti kas 4–6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 paketėlius per 24 val. Nepašlima dozės geriti dažniau nei kas 4 valandas.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Ilgesnę laiką kartojamai kuprojo pakendi infektite.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Richard Bittner AG

ANNUSTAMINE:
Tõõkõõsnuõl (suõlhõõs eskad patsiendid) ja õõ 12-aastased lapsed: tõõhpõõdõõ õõe pakõõse sisu tassi, õõage kuõma vett ja joogõõ igaa 4–6 tunni järel, aga mittõõ rohkem kui 5 pakõõnõõ 24 tunni jooksul. Õõge võõte sagedammin kui igaa 4 tunni järel.

DEVAS:
Pieaugušajiem (ar gados vecākiem cilvēkiem) un bērniem no 12 gadu vecuma: vienas paciņas satura ieberet krūzē ar karstu ūdeni un lietojiet reizi 4–6 stundās, bet ne vairāk par 5 paciņām 24 stundu laikā. Nelietot biežāk ka reizi 4 stundās.

1100001000387 SA10514A

Lot
EXP

13

Vartoti per burną/ Suukuodne/ lekštojai lietuviai

DOZAVIMAS:
Suaugusiems žmonems (įskaitant senyvus) ir vyresniems kaip 12 metų vaikams vieno paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje karšto vandens ir geriti kas 4–6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 paketėlius per 24 val. Nepašlima dozės geriti dažniau nei kas 4 valandas.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Ilgesnę laiką kartojamai kuprojo pakendi infektite.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Richard Bittner AG

ANNUSTAMINE:
Tõõkõõsnuõl (suõlhõõs eskad patsiendid) ja õõ 12-aastased lapsed: tõõhpõõdõõ õõe pakõõse sisu tassi, õõage kuõma vett ja joogõõ igaa 4–6 tunni järel, aga mittõõ rohkem kui 5 pakõõnõõ 24 tunni jooksul. Õõge võõte sagedammin kui igaa 4 tunni järel.

DEVAS:
Pieaugušajiem (ar gados vecākiem cilvēkiem) un bērniem no 12 gadu vecuma: vienas paciņas satura ieberet krūzē ar karstu ūdeni un lietojiet reizi 4–6 stundās, bet ne vairāk par 5 paciņām 24 stundu laikā. Nelietot biežāk ka reizi 4 stundās.

1100001000387 SA10514A

Lot
EXP

14

190 mm

802 mm

262 mm

6 x 8 mm