



EXP

Lot

5 ml flakonas
Doxorubicin
EBEWE
2 mg/ml

5 ml flakonas

**Doxorubicin
EBEWE
2 mg/ml**

**koncentratas infuziniam
tirpalui**

doksorubicino
hidrochloridas
**Tik vienkartiniam
vartojimui.**

SANDOZ

1 ml sterilaus koncentrato yra 2 mg doksorubicino hidrochlorido. Viename 5 ml flakone yra 10 mg doksorubicino hidrochlorido. Pagalbinės medžiagos: vandenilio chlorido rūgštis, natrio chloridas, injekcinis vanduo. Leisti į veną arba vartoti į šlapimo pūslę. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Prieš vartojimą praskiesti. Vartoti tik šviežiai paruoštą ir skaidrų infuzinį tirpalą. Vaisto likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų. Receptinis vaistas.

LT/1/95/0631/001

5 ml flakonas

**Doxorubicin
EBEWE
2 mg/ml**

**koncentratas infuziniam
tirpalui**

doksorubicino
hidrochloridas
**Tik vienkartiniam
vartojimui.**

SANDOZ

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Atidarius flakoną: vartoti iš karto. Paruošto infuzinio tirpalo tinkamumo laikas - 24 val., laikant 2 – 8 °C temperatūroje. Laikyti šaldytuve (2 °C - 8 °C). Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Sandoz d.d.
Verovškova 57
SI-1000 Ljubljana
Slovėnija

11752762-08

5 ml flakonas

**Doxorubicin
EBEWE
2 mg/ml**

koncentratas infuziniam
tirpalui

SANDOZ


10

5 ml

Doxorubicin EBEWE
2 mg/ml

koncentrats infuziniam tirpalui
doksorubicino hidrochloridas
Leisti j venq arba vartoti j
šlapimo pūsle

SANDOZ 11732066-06



Lot
EXP

