



# Ultravist®

623 mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas  
623 mg/ml šķīdums injekcijām un infūzijām  
623 mg/ml sūste- või infusiooilahus  
*iopromidum*

- 8 x 500 ml
- leisti i  
venā/  
arterijā/  
intra-  
venozai/  
intra-  
arteriālai  
lietošanai/  
intra-  
venoosne/  
intra-  
arteriaalne

Calcii dinatrii edetas, trometamolom,  
acidum hydrochloridum, aqua ad iniectionem.  
1 ml tirpalo yra 623 mg jopromido,  
atitinkančio 300 mg jodo.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės  
lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir  
nepasiekiamoje vietoje. Pirmą kartą  
pradūrus buteliuką, tirpalą suvartoti  
per 10 val. Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C  
temperatūroje. Buteliuką laikyti  
išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų  
apsaugotas nuo šviesos. Saugoti nuo  
jonizuojančios spinduliuotės. Receptinis  
vaistas.

1 ml šķīduma satur 623 mg jopromīda,  
kas atbilst 300 mg joda. Pirms lietošanas  
izlasiet lietošanas instrukciju.



4 029668 060528

Uzglabāt bērniem neredzamā un  
nepieejamā vietā. Pēc tiešā

iepakojuma pirmās atvēršanas  
šķīdums jāizlieto 10 stundu laikā.  
Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.  
Sargāt no gaismas un jonizējošā  
starojuma. Receptu zāles.

Ūks ml lahus sisaldab 623 mg  
jopromiidi, mis vastab 300 mg joodile.  
Enne ravimi kasutamist lugege  
pakendi infolehte. Hoida laste  
eest varjatud ja kättesaamatus kohas.  
Pärast sisepakendi esmast avamist  
tuleb lahus ära kasutada 10 tunni  
jooksul. Hoida temperatuuril kuni  
30°C. Hoida valguse ja ioniseeriva  
kiirguse eest kaitstult.  
Retseptiravim.

300 mg I/ml

LT/1/95/2582/006 - LV 96-0119  
EE 082594

Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1  
51373 Leverkusen  
Vokietija/Vācija/Saksamaa

88396383

LOT

EXP

Bayer



# Ultravist®

623 mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas  
623 mg/ml šķīdums injekcijām un infūzijām  
623 mg/ml sūste- või infusioonilahus  
*iopromidum*

1 ml tirpalo yra 623 mg jopromido, atitinkančio 300 mg jodo.  
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.  
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.  
Pirmą kartą pradūrus buteliuką, tirpalą suvartoti per 10 val.  
Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.  
Buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Saugoti nuo jonizuojančios spinduliuotės.  
Receptinis vaistas.

1 ml šķīduma satur 623 mg jopromīda, kas atbilst 300 mg joda.  
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.  
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.  
Pēc tiešā iepakojuma pirmās atvēršanas šķīdums jāizlieto 10 stundu laikā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.  
Sargāt no gaismas un jonizējošā starojuma.  
Recepšu zāles.

Üks ml lahust sisaldab 623 mg jopromiidi, mis vastab 300 mg joodile.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.  
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.  
Pärast sisepakendi esmast avamist tuleb lahus ära kasutada 10 tunni jooksul.  
Hoida temperatuuril kuni 30°C.  
Hoida valguse ja ioniseeriva kiirguse eest kaitstult.  
Retseptiravim.

LT/1/95/2582/006  
LV 96-0119  
EE 082594

300 mg I/ml

- 150 g I
- 500 ml
- leisti j  
vena/  
arterijā  
intra-  
venozaī/  
intra-  
arteriālai  
lietošanai  
intra-  
venoosne/  
intra-  
arteriaalne

LOT  
EXP

Ultravist

LOT

Ultravist

LOT

Ultravist

LOT

Ultravist

LOT

Ultravist

LOT

Ultravist

LOT

00E

00Z

00T

88396375

