

Vaminolact®

infuzinis tirpalas / šķīdums infūzijām / infusioonilahus

10 x 100 ml

1000 ml infuzinio tirpalo yra / 1000 ml šķīduma infūzijām satur / 1000 ml lahus sisaldab: 6,3 g Alaninum, 4,1 g Argininum, 4,1 g Acidum asparticum, 1,0 g Cysteinum/Cystinum, 7,1 g Acidum glutamicum, 2,1 g Glycinum, 2,1 g Histidinum, 3,1 g Isoleucinum, 7,0 g Leucinum, 5,6 g Lysinum, 1,3 g Methioninum, 2,7 g Phenylalaninum, 5,6 g Prolinum, 3,8 g Serinum, 0,3 g Taurinum, 3,6 g Threoninum, 1,4 g Tryptophanum, 0,5 g Tyrosinum, 3,6 g Valinum.

Pagalbinē medžiaga: Aqua ad iniectionabile / Palīgviela: Aqua ad iniectionabile / Abiaine: Aqua ad iniectionabile.

Leisti j venā. Pirms vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Vaistas skirtas tik vienkartinėi infūzijai. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti. Infuzinio tirpalo likučius būtina išpilti. Receptinis vaistas. Kai Vaminolact lašinamas naujagimiams ir jaunesniems kaip 2 metų vaikams, tirpalas (maišeliuose ir infuzijos rinkiniuose) turi būti apsaugotas nuo šviesos, kol lašinamas bus užbaigtas. LT/1/95/1432/001

Intravenozai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Vienreizējai lietošanai. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina. Receptu zāles. Lietojot jaundzimušajiem un bērniem jaunākiem par 2 gadiem, šķīdums (maisos un ievadīšanas komplektos) jāsargā no gaismas līdz ievadīšanas beigām. 02-0111

Intravenoosne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatust kohas. Uhekordeks kasutamiseks. Hoida temperatuurii kuni 25°C. Mitte lasta külmuda. Kasutamata lahus tuleb hävitada. Retseptiravim. Vastsündinutele ja alla 2-aastastele lastele manustamisel tuleb (kottides ja manustamiskomplektides olevaid) lahuseid kaitsa valguse eest kuni manustamise lõpuni. EE 105595

Fresenius Kabi AB
SE-751 74 Uppsala
Rootsi / Zviedrija / Svedija

Serijs / Sērija / Partii nr:
Tinka iki / Derīgs līdz /
Kõlblik kuni:

 FRESENIUS
KABI



M091042/01 LT/LV/EE

4 086000 034456

Vaminolact[®]

infuzinis tirpalas / šķīdums infūzijām / infusioonilahus

1000 ml infuzinio tirpalo yra / 1000 ml šķīduma infūzijām satur / 1000 ml lahust sisaldab: 6,3 g Alaninum, 4,1 g Argininum, 4,1 g Acidum asparticum, 1,0 g Cysteinum/Cystinum, 7,1 g Acidum glutamicum, 2,1 g Glicinum, 2,1 g Histidinum, 3,1 g Isoleucinum, 7,0 g Leucinum, 5,6 g Lysinum, 1,3 g Methioninum, 2,7 g Phenylalaninum, 5,6 g Prolinum, 3,8 g Serinum, 0,3 g Taurinum, 3,6 g Threoninum, 1,4 g Tryptophanum, 0,5 g Tyrosinum, 3,6 g Valinum.

Pagalbinē medžiaga: Aqua ad iniectionabile / Palīgviela: Aqua ad iniectionabile / Abiaine: Aqua ad iniectionabile.

100 ml

Leisti i venā. Pirms vartojamā perskaitykite pakuotēs lapelī. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Vaistas skirtas tik vienkartinėi infuzijai. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje. Negalima užšaldyti. Receptinis vaistas. Kai Vaminolact lašinamas naujagimiams ir jaunesniems kaip 2 metų vaikams, tirpalas (maišeliuose ir infuzijos rinkiniuose) turi būti apsaugotas nuo šviesos, kol lašinimas bus užbaigtas.

Intravenozai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Vienreizējai lietošanai. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt. Lietojot jaundzimušajiem un bērniem jaunākiem par 2 gadiem, šķīdums (maisos un ievadīšanas komplektos) jāsargā no gaismas līdz ievadīšanas beigām.

Intravenoosne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Ühekordseks kasutamiseks. Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte lasta külmuda. Vastsündinutele ja alla 2-aastastele lastele manustamisel tuleb (kottides ja manustamiskomplektides olevaid) lahuseid kaitsta valguse eest kuni manustamise lõpuni.

 **FRESENIUS
KABI**



M091041/02 L/TLV/EE

Lot:
EXP: