PDF nur zur Ansicht!

Üks tablett sisaldab 500 mg atsetüülsalitsüülhapet.
Valu ja palaviku leevendamiseks.
Tablette tuleb võtta eelistatavalt pärast sööki koos piisava koguse veega.
Annustamine: 1…2 tabletti korraga, vajadusel korrata mitte sagedamini kui 4 tunni järel.
Maksimaalne ööpäevane annus on 8 tabletti.

Mitte kasutada alla 16-aastastel lastel.
Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 30 °C.
Käsimüügiravim.

Viena tablete satur 500 mg acetilsalicilskābes.

Sāpju un drudža mazināšanai. Tabletes jālieto pēc ēdienreizēm, uzdzerot lielu daudzumu ūdens.

Lietošana: 1-2 tabletes, pēc nepieciešamības atkārtot pēc vismaz 4 stundu intervāla. Maksimālā dienas deva ir 8 tabletes. Nelietot bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam.

Iekšķīgai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Bezrecepšu zāles.

UAB Bayer
Sporto 18, LT-09238 Vilnius
Leedu/Lietuva

EE 019193 / LV 95-0312 / LT/1/94/0846/001

Bayer

Lot

EXP

Vienoje tabletėje yra 500 mg acetilsalicilo rūgšties.
Skausmui ir karščiavimui malšinti.
Geriausia tablečių vartoti po valgio, užsigeriant dideliu kiekiu vandens.
Dozavimas: po 1–2 tabletes pagal poreikį, bet ne dažniau kaip kas 4 valandas. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės. Neskirtas vartoti jaunesniems kaip 16 metų vaikams ir paaugliams.
Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Nereceptinis vaistas.

88199960
39/20/88

3 838944 101203

20 tablett/tabletes/tablečių

ASPIRIN 500 mg

BAYER

tabletid/tabletes/tabletės acidum acetylsalicylicum

ASPIRIN
500 mg
tabletid/tabletes/tabletės
acidum acetylsalicylicum
88199944/2

ASPIRIN
500 mg
tabletid/tabletes/tabletės
acidum acetylsalicylicum
88199944/1