



(LV) Katra putojošā tablete satur 400 mg acetilsalicilskābes un 240 mg askorbīnskābes.

Simptomātiskai galvas, zobu, kakla, menstruāciju, muskuļu un locītavu, muguras sāpju un vāju artrīta sāpju mazināšanai. Sāpju un drudža mazināšanai pie vispārējas saaukstēšanās un drudža.

Lietošana: 1 - 2 putojošās tabletes, pēc nepieciešamības atkārtot pēc vismaz 4 stundu intervāla. Maksimālā dienas deva ir 10 putojošās tabletes. Pirms lietošanas tableti izšķīdināt glāzē ūdens. Lietošana bērniem nav ieteicama.

Iekšķīgai lietošanai. Satur nātriju. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Bezreceptu zāles.

UAB Bayer, Sporto 18, LT-09238 Vilnius, Leedu/Lietuva
EE 064894 / LV 98-0498 / LT/1/94/0847/001

Bayer

ASPIRIN-C

400 mg/240 mg kihisevad tablešu/
putojošās tabletes/šņypšcīosios tabletes



acidum acetylsalicylicum/
acidum ascorbicum



10 kihisevad tableti
putojošās tabletes
šņypšcīosios tabletes



Lot

EXP

(ET) Ūks tablett sisaldab 400 mg atsetüülsalitsüülhapet ja 240 mg askorbiinhapet.

Kasutatakse peavalu, hambavalu, menstruatsioonivalu, lihas- ja liigesvalu ning palaviku korral; ka külmetushaiguste või gripi puhul esineva valu ja palaviku korral.

Annustamine: 1...2 tabletti korraga, vajadusel korraga mitte sagedamini kui 4 tunni järel. Maksimaalne ööpäevane annus on 10 tabletti. Enne manustamist lahustada tabletti klaasitäies vees. Lastel kasutamine ei ole soovitatav.

Suukaudne. Sisaldab naatriumi. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Käsimeetodiga.

88004477
50/33/92

(LT) Vienoje tablete yra 400 mg acetilsalicilo rūgšties ir 240 mg askorbo rūgšties.
Symptominiam galvos, dantų, gerklės, menstruacinio, raumenų ir sąnarių, nugaros skausmų maitinti bei sąnarių uždegimo sukeltam nespūstam skausmui slopinti ir karščiavimui maitinti.
Dovzimas: po 1-2 tabletes pagal poreikį, bet ne dažniau kaip kas 4 valandas. Didžiausia dienos doze yra 10 tablečių. Prieš vartojimą šņypšcīosios tabletes reikia ištrinti stiklinėje vandens.
Vaikams vartoti nerekomenduojama.
Vartoti per burną. Šūdelėje yra natris. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Nereceptinis vaistas.



ASPIRIN-C

400 mg/240 mg kihisevad
tabletid/putojošas tabletes/
šnypščiosios tabletes
acidum acetylsalicylicum/
acidum ascorbicum



Kihisev tablett
Putojošā tablete
Šnypščioji tablete

88023404

ASPIRIN-C

400 mg/240 mg kihisevad
tabletid/putojošas tabletes/
šnypščiosios tabletes
acidum acetylsalicylicum/
acidum ascorbicum



Kihisev tablett
Putojošā tablete
Šnypščioji tablete

88023404