

Glucose Fresenius 10 % 20 x 250 ml
infuzinis tirpalas / šķīdums infūzijām /
infusioonilahus
Glucosum anhydricum

LT/1/95/0635/015
99-0372
Mūgiloa nr: 148096

1000 ml tirpalo yra 100 g bevandenės gliukozės (monohidrato pavidalu). /
1000 ml šķīduma satur 100 g bezūdens glikozi (glikozes monohidrāta veidā) /
1000 ml lahust sisaldab 100 g veevaba glükoosi.

Pagalbinės medžiagos: / Palīgvielas: / Abiained: Aqua ad iniectionem, Acidum hydrochloricum, Natrii hydroxidum.

Leisti į veną. Receptinis vaistas. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Negalima užšaldyti. Pirmą kartą atidarius talpyklę, tirpalo tinkamumo laikas 12 val. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Intravenozai lietošanai. Receptu žales. Pirms zāļu lietošanas rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Nesasaldēt. Pēc iepakojuma atvēršanas šķīdums derīgs 12 stundas. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Intravenoosne. Retseptiravim. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Mitte lasta külmutada. Pärast avamist ei tohi lahust kasutada kauem kui 12 tundi. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Lenkija / Polija / Poola

 **FRESENIUS
KABI**

Lot:
EXP:



E15230/E LT
PK132E025LT

Glucose Fresenius 10 % 250 ml
infuzinis tirpalas / šķīdums
infūzijām / infusioonilahus
Glucosum anhydricum

LT/1/95/0635/015
99-0372
Mūgiloa nr: 148096

1000 ml tirpalo yra 100 g bevandenės gliukozės (monohidrato pavidalu). /
1000 ml šķīduma satur 100 g bezūdens glikozi (glikozes
monohidrāta veidā) / 1000 ml lahust sisaldab 100 g veevaba
glükoosi.

Pagalbinės medžiagos: / Palīgvielas: / Abiained: Aqua ad iniectionem, Acidum hydrochloricum, Natrii hydroxidum.

Leisti į veną. Receptinis vaistas. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Negalima užšaldyti. Pirmą kartą atidarius talpyklę, tirpalo tinkamumo laikas 12 val. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Intravenozai lietošanai. Receptu žales. Pirms zāļu lietošanas rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Nesasaldēt. Pēc iepakojuma atvēršanas šķīdums derīgs 12 stundas. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Intravenoosne. Retseptiravim. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Mitte lasta külmutada. Pärast avamist ei tohi lahust kasutada kauem kui 12 tundi. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Lenkija / Polija / Poola



 **FRESENIUS
KABI**

 **KabiPac**

GTIN
Lot:
EXP:



200 ml
100 ml
LT/1/95/0635/015

100 ml