

Glucose Fresenius 10 % 20 x 500 ml
infuzinis tirpalas / šķīdums infūzijām /
infusioonilahus
Glucosum anhydricum

LT/1/95/0635/016
99-0372
Mūgiloa nr: 148096

1000 ml tirpalo yra 100 g bevandenės gliukozės (monohidrato pavidalu). /
1000 ml šķīduma satur 100 g bezūdens gliukozi (glikozes monohidrāta veidā) /
1000 ml lahust sisaldab 100 g veevaba glükoosi.

Pagalbinės medžiagos: / Palīgvielas: / Abiained: Aqua ad iniectionem, Acidum hydrochloridum, Natrii hydroxidum.

Leisti į veną. Receptinis vaistas. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Negalima užšaldyti. Pirmą kartą atidarius talpyklę, tirpalo tinkamumo laikas 12 val. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Intravenozai lietošanai. Receptu žaless. Pirms zāļu lietošanas rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Nesasaldēt. Pēc iepakojuma atvēršanas šķīdums derīgs 12 stundas. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Intravenoosne. Retseptiravim. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Mitte lasta külmuda. Pärast avamist ei tohi lahust kasutada kauem kui 12 tundi. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Lenkija / Polija / Poola



Lot:
EXP:



E15232/E LT
PK132E050LT

Glucose Fresenius 10 % 500 ml
infuzinis tirpalas / šķīdums infūzijām /
infusioonilahus
Glucosum anhydricum

LT/1/95/0635/016
99-0372
Mūgiloa nr: 148096

1000 ml tirpalo yra 100 g bevandenės gliukozės (monohidrato pavidalu). / 1000 ml šķīduma satur 100 g bezūdens gliukozi (glikozes monohidrāta veidā) / 1000 ml lahust sisaldab 100 g veevaba glükoosi.

Pagalbinės medžiagos: / Palīgvielas: / Abiained:

Aqua ad iniectionem, Acidum hydrochloridum, Natrii hydroxidum.

Leisti į veną. Receptinis vaistas. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Negalima užšaldyti. Pirmą kartą atidarius talpyklę, tirpalo tinkamumo laikas 12 val. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Intravenozai lietošanai. Receptu žaless. Pirms zāļu lietošanas rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Nesasaldēt. Pēc iepakojuma atvēršanas šķīdums derīgs 12 stundas. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Intravenoosne. Retseptiravim. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Mitte lasta külmuda. Pärast avamist ei tohi lahust kasutada kauem kui 12 tundi. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Fresenius Kabi
Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Lenkija / Polija / Poola



KabiPac



400 ml

E15232/E LT

300 ml

200 ml

GTIN

Lot:

EXP: