

**Kiekvienoje žvakutėje yra 125 mg ibuprofeno** ir pagalbinės medžiagos kietųjų riebalų. Vartoti į tiesiąją žarną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Ibugard 125 mg žvakutės skirtos vaikams nuo 2 metų (12,5 kg kūno svorio) iki 6 metų (20,5 kg kūno svorio). Šis vaistas skirtas vartoti vaikams trumpalaikiam simptominiam silpno ir vidutinio stiprumo skausmo bei karščiavimo gydymui.

Ibugard 125 mg žvakučių rekomenduojama vartoti tada, kai ibuprofeno neįmanoma vartoti per burną. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. Nereceptinis vaistas. LT/1/20/4505/002



# IBUGARD®

125 mg žvakutės / 125 mg supozitoriji  
Ibuprofenum

Vaistas nuo karščiavimo, uždegimo ir skausmo  
Kermeņa temperatūru pazeminošs,  
pretiekaisuma un pretšāpju līdzeklis.

**125 mg**



**Katrs supozitorijis satur 125 mg ibuprofēna** un cietos taukus kā palīgvielu. Rektālai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Ibugard 125 mg supozitoriji paredzēti bērniem no 2 gadu (kermeņa masa 12,5 kg) līdz 6 gadu (kermeņa masa 20,5 kg) vecumam. Šis zāles ir izstrādātas īsai simptomātiskai vieglu vai vidēji stipru sāpju un drudzā ārstēšanai.

Ibugard 125 mg supozitoriju lietošana ir ieteicama, kad nav iespējama perorāla zāļu lietošana. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Bezrecepšu zāles. Reģ. nr. 20-0013



Serija / Serija

Trinka / Trinka / EXP



Amzius (kūno svoris) / Vecums (kermeņa masa) / Venkartinė dozė / Reizes deva	Nuo 2 iki 6 metų (12,5–17 kg) / 2–4 gadi (12,5–17 kg) / 1 žvakutė 125 mg / Viena 125 mg supozitorijis	Nuo 4 iki 6 metų (17–20,5 kg) / 4–6 gadi (17–20,5 kg) / 1 žvakutė 125 mg / Viena 125 mg supozitorijis
Paros dozė / Dienas deva	3 kartus per parą kas 6–8 valandas. Negalima vartoti daugiau kaip 3 žvakučių per parą, 3 reizes diena iki 6–8 stundam. Neltot vaikak nekā 3 supozitorijus diena.	4 kartus per parą kas 6 valandas. Negalima vartoti daugiau kaip 4 žvakučių per parą, 4 reizes diena iki 6 stundam. Neltot vaikak nekā 4 supozitorijus diena.

**Nelietot bērniem ar kermeņa masu, kas mazāka par 12,5 kg.** Didžiausia ibuprofeno paros dozė yra 20–30 mg/kg kūno svorio, padalyta į 3–4 vienkartines dozes. Ibugard 125 mg supozitorijai skirtas vaikams, kurių kūno svoris mažesnis nei 12,5 kg. Paros dozė / Dienos deva: Paras dozes ir sadas Nepasiegti maksimalio dienos devu.





Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A.  
19 Peplifinska Street, 83-200 Starogard Gdański  
Lenkija / Polija

Zapis w systemie Braille'a /  
Braille inscriptions



Material/ Material:	<b>PUDEŁKO Z NADRUKIEM/ BOX WITH OVERPRINT</b>							
Wzór/Artwork:			Kolorystyka/ Colours:					
Preparat/ Product:	<b>IBUGARD 125 mg x 10 pcs.</b>							
Minimalny rozmiar czcionki/ Minimum font size:	Interlinia/ Interline spacing:	-	Farmakod/ Pharmacode:	-	Format strony/ Page format:	<b>A4</b>	Opracował/ Prepared by:	<b>27.10.2020 T. Parol</b>



Material/ Material:		<b>FOLIA / FOIL</b>					
Wzór/Artwork:		Uwagi/ Comments:					
Preparat/ Product:		<b>IBUGARD 125 mg</b>		Kolorystyka/ Colours:			
Minimalny rozmiar czcionki/ Minimum font size:		Format strony/ Page format:	<b>A4</b>	Farmakod/ Pharmacode:	<b>n/d</b>	Opracował/ Prepared by:	<b>13.01.2021 T. Parol</b>