



Leisti į veną.

oksacilinas

Oxacilina Atb®

1000 mg

10 flakonų

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje, gamintojo pakuotėje. Paruoštą arba praskiestą tirpalą reikia vartoti nedelsiant. Receptinis vaistas.

Lygiagrečiai importuojamas vaistas nuo referencinio vaisto skiriasi pagalbinėmis medžiagomis: lygiagrečiai importuojamo vaisto sudėtyje yra bevandenio dinatrio vandenilio fosfato; tinkamumo laikui: lygiagrečiai importuojamo vaisto – 4 metai, referencinio vaisto – 3 metai; paruošto vaisto laikymo sąlygomis: paruoštas/praskiestas referencinis vaistas gali būti laikomas ne ilgiau nei 24 valandas 2–8 °C temperatūroje, paruoštą/praskiestą lygiagrečiai importuojamą vaistą reikia vartoti nedelsiant; tirpalo paruošimu: referencinį vaistą reikia tirpinti 5 ml 0,9 % natrio chlorido tirpalo arba 5% gliukozės tirpalo arba injekcinio vandens, o lygiagrečiai importuojamą vaistą – 10 ml 0,9 % natrio chlorido tirpalo arba injekcinio vandens.

Antibiotice



CBXXX X/002-01
MLO86

LT/L

Lygiagretus importuotojas
UAB „Ideal Trade Links“

Gamintojas:
Antibiotice S. A., Rumunija

Oxacilina Atb®

1000 mg

10 flakonų

milteliai injekciniam tirpalui
oksacilinas

Viename flakone yra 1000 mg oksacilino (oksalilino natrio druskos pavidaui).
Sudėtyje yra natrio. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.
Pagalbinės medžiagos: bevandenį dinatrio vandenilio fosfatą.

Leisti į veną.

Antibiotice



Oxacilina Atb®

1000 mg

milteliai injekciniam tirpalui
oksacilinas

10 flakonų

PC:
Perpakavo: