

Paclitaxelum

koncentrāts infūzijām
tīrpalui / koncentrāts infūziju
šķīduma pagatavošanai /
infusioonišķīdumu koncentrāts

Paclitaxel
Kabi 6 mg/ml

300 mg/50 ml

65.53.85
LTU/LVA/EST

(LT) 1 ml yra 6 mg paklitakselio. Kiekviena 50 ml flakone yra 300 mg paklitakselio. Pagalbinės medžiagos: Ethanolum anhydricum, Macrogolglyceroli ricinoleas, Acidum citricum anhydricum (pH koreguoti). **Leisti tik į veną. Prieš vartojant būtina praskiesti. Turi būti vartojamas per sistemą su filtru.** Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Paruošto vaisto tinkamumo laikas nurodytas pakuotės lapelyje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. Nesuvargotą vaistą reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų, taikomų citotoksiniams medžiagoms. Receptinis vaistas.

LT/1/09/1602/005
09-0260
Mūgiloa nr: 623909

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Lenkija / Polija / Poola

(LV) 1 ml satur: 6 mg paklitakselā. Katrs 50 ml flakons satur 300 mg paklitakselā. Palīgvielas: Ethanolum anhydricum, Macrogolglyceroli ricinoleas, Acidum citricum anhydricum (pH pielāgošanai). **Tikai intravenozai lietošanai. Pirms lietošanas jāatšķaida. Jāievada, izmantojot sistēmu ar iekšējo filtru.** Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Izlasiet lietošanas instrukciju, lai uzzinātu atšķaidītā produkta derīguma termiņu. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt flakonu kartona kastītē, lai pasargātu no gaismas. Visi neizlietotie produkti jāiznīcina atbilstoši vietējiem noteikumiem par rīkošanas ar citotoksiskiem savienojumiem. Receptu zāles.

Code No.: HP/156/06

300 mg/50 ml

Paclitaxel
Kabi 6 mg/ml
koncentrāts infūzijām
tīrpalui / koncentrāts infūziju
šķīduma pagatavošanai /
infusioonišķīdumu koncentrāts

Paclitaxelum

Citotoksiskā medžiaga /
Citotoksisks līdzeklis /
Tsūtostaatikums

1 flakons / 1 flakons / 1 viaal



FRESENIUS
KABI

(EE) 1 ml sisaldab 6 mg paklitakseeli. Üks 50 ml viaal sisaldab 300 mg paklitakseeli. Abiained: Ethanolum anhydricum, Macrogolglyceroli ricinoleas, Acidum citricum anhydricum (pH reguleerimiseks). **Ainult intravenoosne. Enne kasutamist lahjendada. Ravimit tuleb manustada läbi infusioonisüsteemi sees oleva filtri.** Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult. Kasutamata ravim hävitada vastavalt tsütotoksiliste ainete käitlemisel kehtivatele nõuetele. Retseptiravim. Manustamiskõlblikuks muudetud ravimpreparaadi säilitamistingimusi vt pakendi infoleht.

7220087660

PC:
LOT:
EXP:
SN:

(LT) 1 ml yra 6 mg paklitakselio. Kiekviename 50 ml flakone yra 300 mg paklitakselio. Pagalbinės medžiagos: Ethanolum anhydricum, Macrogolglyceroli ricinoleas, Acidum citricum anhydricum (pH koreguoti). Leisti tik į veną.

Pastaba: prieš vartojant būtina praskiesti. Turi būti vartojamas per sistemą su filtru. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. Nesuvargotą vaistą reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų, taikomų citotoksinėms medžiagoms. Receptinis vaistas.

(LV) 1 ml satur: 6 mg paklitaksela. Katrs 50 ml flakons satur 300 mg paklitaksela. Paliqvielas: Ethanolum anhydricum, Macrogolglyceroli ricinoleas, Acidum citricum anhydricum (pH pielagošanai). Tikai intravenozai lietošanai. **Bridinajums: pirms lietošanas jāatšķaida. Jāievada, izmantojot sistēmu ar iekšējo filtru.** Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt flakonū kartona kastītē, lai pasargātu no gaismas. Iznicināt jebkuru neizlietotu

300 mg/50 ml

Paclitaxel Kabi 6 mg/ml
koncentrats infuziniam
tirpalui / koncentrats infūzijū
šķīduma pagatavošanai /
infusioņilāhuse kontsentrāt

Paclitaxelum
Citotoksīnē medžiaga /
Citotoksisks līdzeklis /
Tsūtostaatikum

1 flakonas / 1 flakons / 1 viala



šķīdumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem par rīkošanos ar citotoksiskiem savienojumiem. Receptšu zāles.

(EE) 1 ml sisaldab 6 mg paklitakseeli. Üks 50 ml vialal sisaldab 300 mg paklitakseeli. Abiained: Ethanolum anhydricum, Macrogolglyceroli ricinoleas, Acidum citricum anhydricum (pH reguleerimiseks). **Ainult intravenoosne. Ettevaatus: enne kasutamist lahjendada. Ravimit tuleb manustada läbi infusioonisüsteemi sees oleva filtri.** Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kültesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida vialal välispakendis, valguse eest kaitstult. Kasutamata ravim hävitada vastavalt tsütotoksiliste ainete käitlemisele kehivatele nõuetele. Retseptiravim.

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Lenkija / Poolja / Poola

LT/1/09/602/005
09-0260
Müügiloa nr: 623909

722097183 Code No.: HP/156/06



Lot:
EXP: