

Fulvestrant ALIUD
250 mg injekcija / sūste

fulvestrantum
i.m.
5 ml

STADA
Lot. EXP
ARTD8030855L

STADA

2 saugiosios adatos
2 drošības adatas
2 turvanōela

2 uzpildyti švirkštai (po 5 ml)
2 pilnšļirces (katra pa 5 ml)
2 sūstīt (īgas 5 ml)

2 x 5 ml

Fulvestrant ALIUD 250 mg

injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte /
šķīdums injekcijām pilnšļircē /
sūstelahus sūstlis

fulvestrantum i.m.

ARTD8030855C

83 x 34 x 185

Kiekviename užpildytame švirkšte (5 ml tirpalo) yra 250 mg fulvestranto. Kiekviename tirpalo ml yra 50 mg fulvestranto. Sudėtyje yra etanolio (96 %), benzilo alkoholio, benzilbenzoato ir rafinuoto ricinos aliejaus. Receptinis vaistas. LT/1/24/5608/002

Katra pilnšļirce satur 250 mg fulvestranta 5 ml šķīduma. Katrs ml šķīduma satur 50 mg fulvestranta. Satur etilspirtu (96%), benzilspirtu, benzilbenzoātu un ricinēļu (attīrītu). Receptīšu zāles. Reg.Nr.: 24-0282

Ūks sūstel satur 250 mg fulvestranti 5 ml lahuses. Ūks ml lahust satur 50 mg fulvestranti. Satur etanolio (96%), bensūlalkoholi, bensūlbensoati ja rafineeritū riitsinusōli. Retseptiravim. Mūūglōa nr. 1176224

Fulvestrant ALIUD 250 mg

injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte /
šķīdums injekcijām pilnšļircē /
sūstelahus sūstlis

fulvestrantum i.m.

2 uzpildyti švirkštai (po 5 ml) + 2 saugiosios adatos
2 pilnšļirces (katra pa 5 ml) + 2 drošības adatas
2 sūstīt (īgas 5 ml) + 2 turvanōela

STADA

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Tik vienkartiniam vartojimui. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Po atidarymo, vaistą reikia vartoti nedelsiant. Laikyti ir transportuoti šaldytuve (2°C–8°C). Užpildytą švirkštą laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Tikai vienreizējai lietošanai. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Pēc atvēršanas šīs zāles jālieto nekavējoties. Uzglabāt un transportēt ledusskapī (2°C–8°C). Uzglabāt pilnšļirci oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Ainult ühekordseks kasutamiseks. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Pärast avamist tuleb ravim kohe ära kasutada. Hoida ja transportida külmās (2°C...8°C). Hoida sūstel originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

4 011548 049631