



v3.5




4381

ACC
100 mg
milteliai/
pulveris/
pulber

o o o o



Leserichtung
reading direction



SANDOZ A Novartis Division
acetylcysteinum
ACC[®] 100 mg
milteliai geriamajam tirpalui / pulveris iekškigi lietojama / suukaudse lahuse pulber /
škūiduma pagatavošanai / suukaudse lahuse pulber

Code - 4381
40131118
108x42x85
50086522

LT Vaistas, skystinantis kvėpavimo takų gleives.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti per burną.
Kiekviename paketylyje (3 g) miltelių yra 100 mg acetilcisteino.
Sudatyje yra sacharozės, gliukozės ir laktozės.
Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite pakuotės lapelį.
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Dozavimas. Suaugusiesiems 4-6 paketyliai per parą, vaikams - priklausomai nuo amžiaus. Žr. pakuotės lapelį.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Nereceptinis vaistas. LT/1/97/0593/005

LV Mukolītisks līdzeklis.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Iekškīgi lietošanai.
Katrs paciņa (3 g) pulvera satur 100 mg acetilcisteina.
Satur saharozi, gliukozi un laktozi. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Devas. Pieaugušajiem 2 pulvera paciņas 2 – 3 reizes dienā, bērniem – atkarībā no vecuma.
Skatīt lietošanas instrukciju. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.
Bezrecepšu zāles. Reģ.nr.: 00-0284

EE Rõge lahtistamine.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne.
Üks kotike (3 g) pulbriga sisaldab 100 mg atsetültsüsteini.
Sisaldab sahharoosi, glükooosi ja laktoosi. Lisateavet vt pakendi infolehtelt.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Annustamine: täiskasvanud 4...6 kotikest ööpäevas.
Lapsed vastavalt vanusele – lugege pakendi infolehte.
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Käsimeetodiga. Müügiloa nr: 298800



Sandoz d.d.
Verovškova 57
SI-1000 Ljubljana
Slovėnija/Slovėnija/Slovenia

ACC[®] 100 mg

milteliai geriamajam tirpalui/
pulveris iekškigi lietojama /
škūiduma pagatavošanai /
suukaudse lahuse pulber

acetylcysteinum



20

paketyliu
paciņas
kotikest

SANDOZ A Novartis Division

ACC[®]
100 mg

milteliai geriamajam tirpalui/
pulveris iekškigi lietojama
škūiduma pagatavošanai /
suukaudse lahuse pulber

acetylcysteinum

SANDOZ A Novartis Division

Lot
EXP



Leserichtung
reading direction



| | |
|--|--|
| <p>ACC® 100 mg miltelīai gerīamajam tirpalui/ pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai/suukaudse lahuse pulber</p> <p>acetylcysteinum</p> <p>LT Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.</p> <p>LV Iekšķīgi lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.</p> <p>EE Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.</p> <p>3 g</p> <p>SANDOZ A Novartis Division</p> | <p>ACC® 100 mg miltelīai gerīamajam tirpalui/ pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai/suukaudse lahuse pulber</p> <p>acetylcysteinum</p> <p>LT Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.</p> <p>LV Iekšķīgi lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.</p> <p>EE Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.</p> <p>3 g</p> <p>SANDOZ A Novartis Division</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>ACC® 100 mg miltelīai gerīamajam tirpalui/ pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai/suukaudse lahuse pulber</p> <p>acetylcysteinum</p> <p>3 g</p> <p>SANDOZ A Novartis Division</p> <p>40131117 50086523</p> | <p>ACC® 100 mg miltelīai gerīamajam tirpalui/ pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai/suukaudse lahuse pulber</p> <p>acetylcysteinum</p> <p>3 g</p> <p>SANDOZ A Novartis Division</p> <p>40131117 50086523</p> |
|---|---|