









Carton box

-  PANTONE 631 U
-  PANTONE 382 U
-  PANTONE 7527 U
-  PANTONE 426 U
-  Pantone WARM RED
-  PANTONE 631 U 80%
-  PANTONE 631 U 60%



Container



Information regarding the expiry date and batch number is printed on the bottom of the container.

Viename grame suspensijos yra 9,3 mg oksitetraciklino (hidrochlorido pavidalu) ir 3,1 mg hidrokortizono.

Pagalbinės medžiagos: sorbitano trioleatas, lecitinas, izopropilo miristatas, propano, butano ir izobutano mišinys.

Saugoti, kad purškalo nepatektų į akis ir kvėpavimo takus.

Prieš kiekvieną vartojimą slėginę talpyklę kelis kartus stipriai supurtyti.

Purškiant slėginę talpyklę laikyti staciai.

Vaistą purkšti ant pažeistos vietos 15 – 20 cm atstumu.

Receptinis vaistinis preparatas.

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A.
ul. A. Fleminga 2
03–176 Warszawa
Lenkija

Tinka iki:
Serija:


LT/1/94/0020/002

OXYCORT

9,3 mg/3,1 mg/g

odos purškalas (suspensija)

Oksitetraciklinas ir hidrokortizonas



32,25 g

POLFA TARCHOMIN S.A.

- Ypač degios dujos.
- Slėginė talpyklė. Kaitinama gali sprogti.
- Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
- Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
- Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
- Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.


Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti ant odos.


Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

PAVOJUS




alu



32,25 g suspensijos

Label



Information regarding the expiry date and batch number is printed on the bottom of the container.

Viename grame suspensijos yra 9,3 mg oksitetraciklino (hidrochlorido pavidalu) ir 3,1 mg hidrokortizono.

Pagalbinės medžiagos: sorbitano trioleatas, lecitinas, izopropilo miristatas, propano, butano ir izobutano mišinys.

Saugoti, kad purškalo nepatektų į akis ir kvėpavimo takus.

Prieš kiekvieną vartojimą slėginę talpyklę kelis kartus stipriai supurtyti.

Purškiant slėginę talpyklę laikyti staciai.

Vaistą purkšti ant pažeistos vietos 15 – 20 cm atstumu.

Receptinis vaistinis preparatas.

Tarchoński Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A.
ul. A. Fleminga 2
03–176 Warszawa
Lenkija

Tinka iki:
Serija:

Pharmacode

LT/1/94/0020/002

OXYCORT

9,3 mg/3,1 mg/g

odos purškalas (suspensija)

Oksitetraciklinas ir hidrokortizonas



32,25 g

POLFA TARCHOMIN S.A.

• Ypač degios dujos.
• Slėginė talpyklė. Kaitinama gali sprogti.
• Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
• Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
• Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
• Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Vartoti ant odos.
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

PAVOJUS



alu

32,25 g suspensijos