

Vienoje modifikuoto atpalaidavimo tablete jā ir 200 mg karbamazepīna. Sudētyje jā ir makrogolģlicerolio hidroksisteāratu (īssāmesņe informācijā žr. pakuošes lapelyje). Laikyti ne aukštesņe kaip 30 °C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuošēje, kad vaistas būtu apsaugotas nuo dregmēs.

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Vartoti per burnā. Priēs vartojimā perskaitykite pakuošes lapelį. Receptinis vaistas. LT/1.02/2356/001

Tegretol® CR 200 mg

ilgstošās darbības apvalkotās tabletes/
modifikuoto atpalaidavimo plēvele dengtos tablešes


carbamazepinum

50 ilgstošās darbības apvalkotās tabletes/
modifikuoto atpalaidavimo plēvele dengtų tablešų

Viena ilgstošās darbības apvalkota tablete satur 200 mg karbamazepīna. Satur makrogolģlicerīna hidroksisteāratu/polioksilhidrogenētu ricinellju. Sītkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā. Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Iekšīgi lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Receptu zāles. LV Reģ. Nr.: 97-0530

PC 07613421174231

Lot
EXP



9106363-R06

S210/D

SIA Novartis Baltics
Skanstes iela 25
LV-1013, Rīga
Latvija

Tegretol® CR 200 mg

ilgstošās darbības apvalkotās tabletes/
modifikuoto atpalaidavimo plēvele dengtos tablešes

carbamazepinum

50 ilgstošās darbības apvalkotās tabletes/modifikuoto atpalaidavimo plēvele dengtų tablešų

Tegretol® CR 200 mg
ilgstošās darbības apvalkotās tabletes/
modifikuoto atpalaidavimo plēvele dengtų tablešų
carbamazepinum



 NOVARTIS

63 mm

63 mm

63 mm

3 mm



5 m

4 m



3 mm