

Versión PreAF-INIBSA-20003185  
 Fecha 05 02 2021  
 Cliente INIBSA DENTAL  
 Producto 20003185  
 Troquel Sin información  
 Medidas int. Sin información  
 Comentarios

Pantone  
■ Warm Red C ■ Process Cyan C ■ 2955 C

BOX 50 cart x 1.8 ml  
 325 g/m2

RESERVED AREA VARNISH  
 MARKING AREA AND VARNISH  
 TEXT AREA  
 DIECUT

NUEVO PERFIL

30 mm

10 mm

14 mm

11 mm

1234567891012  
1234567891012  
A B C D 1 2 3 4  
MM - YYYY

50 kārtrīdi pa 1,8 ml / Šķidums injekcijām

Artikaini hidrochloridum / Epinephrinum

**DENTOCAINE**  
40 mg/0,01 mg/ml  
šķidums injekcijām

**DENTOCAINE**  
40 mg/0,01 mg/ml  
süstelahus

Artikainivesinikloriid/Epinefriin (adrenaliin)

50 kolbampulli, igas 1.8 ml  
Süstelahus

**Dentocaine**  
40 mg/0,01 mg/ml  
injekcinis tirpalas

Artikaino hidrochloridas/epinefrinas (adrenalinās)

50 uztaišu po 1,8 ml / Injekcinis tirpalas

20003185v500

**Oromukosaalne.** Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida kolbampulle välispakendis, valguse eest kaitstult. Retseptiravim.

Vartoti ant burnos gleivinės. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje. Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Užtaisu laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Receptinis vaistinis preparatas.

Injekcijām. Lietošānai mutes dobumā. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Glabājiet kārtiņdžus kārbīņā, lai pasargātu tās no gaismas. Receptu zāles.

Ūks kolbampull (1,8 ml) sisaldab 72 mg artikainivesinikloriidi ja 0,018 mg epinefriini (tartraadina). 1 ml sisaldab 40 mg artikainivesinikloriidi ja 0,01 mg epinefriini (tartraadina). Abiained: naatriumkloriid, naatriummetabisulfit, vesinikloriidhape, naatriumhüdroksiid, süstevesi. Lisateavet vaadake infolehest.

Vieneme uztaise (1,8 ml) yra 72 mg artikaino hidrochlorido ir 0,018 mg epinefrino (tartrato pavidalu). Viename mililitre yra 40 mg artikaino hidrochlorido ir 0,01 mg epinefrino (tartrato pavidalu). Natrio chloridas, natrio metabisulfitas, vandenilio chlorido rūgštis, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

Katrā kārtiņdžā (1,8 ml) ir 72 mg artikaina hidrochlorida un 0,018 mg epinefrina (tartrāta formā). Vienā ml ir 40 mg artikaina hidrochlorida un 0,01 mg epinefrina (tartrāta formā). Nātrija hlorīds, nātrija metabisulfits, sālskābe, nātrija hidroksiīds, ūdens injekcijām. Sīkaku informāciju skat. lietošanas instrukcijā.

**INIBSA DENTAL S.L.U.**  
Ctra. Sabadell a Granollers, km 14,5  
08185 Lliçà de Vall, Barcelona  
Hispania / Ispanija / Spānija

Reg.Nr: 646309  
LT/1/09/1745/003 - N50  
09-0361

2000318500

2000318500