

Versión PreAF2-INIBSA-20003186
 Fecha 16 11 2020
 Cliente INIBSA DENTAL
 Producto 20003186
 Troquel Sin información
 Medidas int. Sin información
 Comentarios

Pantone
■ Warm Red C ■ Process Cyan C ■ 2955 C ■ 137C

BOX 50 cart x 1.8 ml
 325 g/m2

RESERVED AREA VARNISH
 MARKING AREA AND VARNISH
 TEXT AREA
 DIECUT

NUEVO PERFIL

50 kartriži pa 1,8 ml / Šķidrums injekcijām

Artikaini hidrochloridum /Epinephrinum

40 mg/0,005 mg/ml

DENTOCAINE

Šķidrums injekcijām

DENTOCAINE

40 mg/0,005 mg/ml

sūstelahus

Artikainivesnikloriid/Epinefriin (adrenaliin)

50 kolbampulli, igas 1.8 ml

Sūstelahus

Dentocaine

40 mg/0,005 mg/ml

injekcinis tirpalas

Artikaino hidrochloridas/epinefrinas (adrenalinās)

50 užiņaiņ po 1,8 ml / Injekcinis tirpalas

Öromukosaalne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida kolbampulle välispakendis, valguse eest kaitstult. Retseptiravim.

Vartoti ant burnos gleivinės. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje. Laikyti žemesnėje kaip 30 C temperatūroje. Užtaisus laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Receptinis vaistinis preparatas.

Injekcijām. Lietošanai mutes dobumā. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Glabājiet kārtiņzūz kārbīnā, lai pasargātu tās no gaismas. Receptu zāles.

Uks kolbampull (1,8 ml) sisaldab 72 mg artikainivesnikloriidi ja 0,09 mg epinefriini (tartraadina). 1 ml sisaldab 40 mg artikainivesnikloriidi ja 0,005 mg epinefriini (tartraadina). Abiained: naatriumkloriid, naatriummetabisulfit, vesnikloriidhape, naatriumhüdrosiid, süstevesi. Lisateavet vaadake infolehest.

Viename užiņaise (1,8 ml) yra 72 mg artikaino hidrochlorido ir 0,009 mg epinefrino (tartrato pavidalu). Viename millitre yra 40 mg artikaino hidrochlorido ir 0,005 mg epinefrino (tartrato pavidalu). Natrio chloridas, natrio metabisulfitas, vandenilio chlorido rūgštis, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

Katrā kārtiņzūzā (1,8 ml) ir 72 mg artikaina hidrochlorida un 0,009 mg epinefrina (tartrāta formā). Vienā ml ir 40 mg artikaina hidrochlorida un 0,005 mg epinefrina (tartrāta formā). Nātrija hlorīds, nātrija metabisulfitis, sāļsskābe, nātrija hidroksīds, ūdens injekcijām. Sīkāku informāciju skat. lietošanas instrukcijā.

INIBSA DENTAL S.L.U.
 Ctra. Sabadell a Granollers, km 14,5
 08185 Lliçà de Vall, Barcelona
 Hispania / Ispanija / Spānija

Reg.Nr: 646209
 LT/1/09/1745/001 - N50
 09-0362

DENTOCAINE

40 mg/0,005 mg/ml

2000318600

2000318600