688769.1 OH

Ropivacaína Altan 7,5 mg/ml
Solución inyectable EFG
Solução injetável MG

75 mg/10 ml

5 Ampollas / Ampolas de 10 ml

Vía perineural y epidural
Administração perineural e epidural

ALTAN

Altan Pharmaceuticals, S.A.
C/ Cólquide 6, Portal 2, 1ª planta, Oficina F, Edificio Prisma
Las Rozas 28230 (Madrid)
España - Espanha

Ropivacaína Altan 7,5 mg/ml
Solução injetável MG
75 mg/10 ml

Ropivacaína Altan 7,5 mg/ml
Solución inyectable EFG
75 mg/10 ml

Cada ml contiene hidrocloruro de ropivacaína monohidrato equivalente a 7,5 mg de hidrocloruro de ropivacaína.
Cada ampolla de 10 ml contiene 75 mg de hidrocloruro de ropivacaína.
Excipientes: cloruro de sodio, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, agua para preparaciones inyectables.
Para mayor información consultar el prospecto.
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento.
Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.
Para un único uso.
Desechar cualquier solución no utilizada.
Usar inmediatamente después de la apertura.
Consulte el prospecto para la fecha de caducidad después de la apertura.
No congelar.
MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN MÉDICA.
Uso hospitalario.

8 470005 887691

Cada ml de solução injetável contém cloridrato de ropivacaína mono-hidratado equivalente a 7,5 mg de cloridrato de ropivacaína.
Cada ampola de 10 ml contém 75 mg de cloridrato de ropivacaína.
Excipientes: cloreto de sódio, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e água para injetáveis.
Consultar folheto informativo para mais informação.
Administração perineural e epidural.
Consultar o folheto informativo antes de utilizar.
Manter fora da vista e do alcance das crianças.
Para utilização única.
Rejeitar toda a solução que não tenha sido utilizada.
Utilizar imediatamente após abertura.
Consultar o folheto informativo para o prazo de validade após abertura.
Não congelar.
Medicamento sujeito a receita médica restrita.
Uso hospitalar.

5768148

Conducción: ver prospecto