


Place for transparent safety label with perforation →

← Place for transparent safety label with perforation



Lunaldin #300 mcg

**I** Kiekvienoje poliežuvinėje tabletėje yra 300 mikrogramų fentanilio (citrato pavidalu). Vartoti po liežuviu. Turi iširti po liežuviu. Nepraryti. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Preparatas turi būti vartojamas TIK taip, kaip nurodyta. Jei preparatą vartotų kitas asmuo, preparatas gali sukelti RIMTĄ pavojų sveikatai. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės. Rekomenduojama LUNALDIN laikyti užrakintą. Jei įmanoma, nesuvartotas preparatas turi būti atiduotas vaistininkui. Receptinis vaistas. N10 – LT/1/09/1528/007

**II** Viena tablete lietošanai zem mēles satur: 300 mikrogramu fentanila (citrāta formā). Lietošanai zem mēles. Izšķīdiniet, turot zem mēles. Nenorijiet. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Šis zāles lietojamas TIKAI saskaņā ar ārsta norādījumiem. Ja zāles lieto kāda cita persona, tas var NOPIETNI apdraudēt veselību. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma. Lunaldin ieteicams uzglabāt slēgtā vietā. Neizlietotās zāles jānodod farmaceitam, ja vien tas iespējams. Receptu zāles. Reg. nr.: 090098

**III** Üks keelealune tablett sisaldab 300 mikrogrammi fentanüüli (tsitraadina). Keelealune. Lahustada keele all. Mitte alla neelata. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohtas. Seda ravimit tohib kasutada AINULT vastavalt ettekirjutusele. Kui ravimit kasutab keegi teine, kaasneb sellega TOSINE risk selle isiku tervisele. Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult. LUNALDIN'i on soovitatav hoida lukustatud säilituskohtas. Kasutamata jäänud ravimid tagastage võimalusel apteeki hävitamiseks. Receptiravim. Müügiloo nr: 626109

**GEDEON RICHTER**

Fentanylum/fentanil/*Fentanylum/fentanil*/*Fentanylum/fentanil*

300 µg sublingvālni tableti/300 mikrogramov sublingvālnie tableti/300 µg poliežuvinēs tabletes/  
300 µg tabletes lietošanai zem mēles/300 µg keelealusēd tabletiēd/300 microgramme  
comprimāte sublinguale/300 µg sublingvālni tableti/300 mikrogramov sublingvālnie tableti/  
300 µg poliežuvinēs tabletes/300 µg tabletes lietošanai zem mēles/300 µg keelealusēd tabletiēd/  
300 microgramme comprimāte sublinguale

Gedeon Richter Plc. Gedeon Richter Plc. Gedeon Richter Plc. Gedeon Richter Plc. Gedeon Richter Plc.

Fentanylum/fentanil/*Fentanylum/fentanil*/*Fentanylum/fentanil*/*Fentanylum/fentanil*

300 µg sublingvālni tableti/300 mikrogramov sublingvālnie tableti/300 µg poliežuvinēs tabletes/  
300 µg tabletes lietošanai zem mēles/300 µg keelealusēd tabletiēd/300 microgramme  
comprimāte sublinguale/300 µg sublingvālni tableti/300 mikrogramov sublingvālnie tableti/  
300 µg poliežuvinēs tabletes/300 µg tabletes lietošanai zem mēles/300 µg keelealusēd tabletiēd/  
300 microgramme comprimāte sublinguale

Gedeon Richter Plc. Gedeon Richter Plc. Gedeon Richter Plc. Gedeon Richter Plc. Gedeon Richter Plc.

10000003387

Fentanylum/fentanil/*Fentanylum/fentanil*/*Fentanylum/fentanil*/*Fentanylum/fentanil*

300 µg sublingvālni tableti/300 mikrogramov sublingvālnie tableti/300 µg poliežuvinēs tabletes/  
300 µg tabletes lietošanai zem mēles/300 µg keelealusēd tabletiēd/300 microgramme  
comprimāte sublinguale/300 µg sublingvālni tableti/300 mikrogramov sublingvālnie tableti/  
300 µg poliežuvinēs tabletes/300 µg tabletes lietošanai zem mēles/300 µg keelealusēd tabletiēd/  
300 microgramme comprimāte sublinguale

Gedeon Richter Plc. Gedeon Richter Plc. Gedeon Richter Plc. Gedeon Richter Plc. Gedeon Richter Plc.