

40.40.70
LTU/LVA/EST

100 mg/5 ml
Etoposide Kabi
20 mg/ml
koncentrats infūzijām tirpalai /
koncentrats infūziju šķīduma
pagatavošanai / infusioonilahuse
konsentraat

Macrogolum 300, Polysorbatum 80 (E433), Alcohol
benzyllicus (E1519), Ethanolum, Acidum citricum
anhydricum (E330).

Code No.: HP/156/06
LT/1/14/3565/001
Reg.Nr.: 14-0165
Mūgiloa nr: 843214

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Lenkija / Polija / Poola



Ⓛ 1 ml koncentrato infūzijām tirpalai yra 20 mg etopozido. Kiekviename 5 ml flakone yra 100 mg etopozido. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje. **Praskiestą vaistą lėtai infuzuoti į veną.** Leisti į veną. Tik vienkartiniam vartojimui. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. **Sudėtyje yra benzilo alkoholio. Negalima skirti neišnešiotiems kūdikiams ir naujagimiams. Kūdikiams ir vaikams iki 3 metų gali sukelti toksinių ir alerginių reakcijų.** Prieš vartojimą praskiesti. Informacijos apie praskiesto vaisto tinkamumo laiką pateikiama pakuotės lapelyje. Negalima užšaldyti. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. Nesuvargotą vaistą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų. Receptinis vaistas.

Ⓛ 2 Katrs ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai satur 20 mg etopozīda. Katrs 5 ml flakons satur 100 mg etopozīda. Sīkākū informāciju skatīt lietošanas instrukcijā. **Ievadīšanai lēnas intravenozas infūzijas veidā, iepriekš atšķaidot.** Intravenozai lietošanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Satur benzilspirtu. Nedrīkst ievadīt priekšlaikus dzimušiem bērniem un jaundzimušajiem. Bērniem līdz 3 gadu vecumam var izraisīt toksiskas reakcijas un alergiskas reakcijas. Pirms lietošanas atšķaidīt. Informāciju par atšķaidītu zāļu uzglabāšanu skatīt lietošanas instrukcijā. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Receptu zāles.

Ⓛ 1 ml infusioonilahuse konsentraati sisaldab 20 mg etoposidi. Üks 5 ml viaal sisaldab 100 mg etoposidi. Lisainfot vt pakendi infolehest. **Aeglane intravenoosne infusioon pärast lahjendamist.** Intravenoosne. Ainult iihokordseks kasutamiseks. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. **Sisaldab bensüülalkoholi, ravimit ei tohi manustada enneaegsetele lastele või vastsündinutele. Võib põhjustada toksilisi ja allergilisi reaktsioone alla 3-aastastel lastel ja imikutel.** Enne kasutamist lahjendada. Lahjendatud ravimi kõlblikkusaeg: vt pakendi infolehte. Mitte lasta külmuda. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Retseptiravim.

100 mg/5 ml
Etoposide Kabi
20 mg/ml
koncentrats infūzijām tirpalai /
koncentrats infūziju šķīduma
pagatavošanai / infusioonilahuse
konsentraat

Etoposidum

Citotoksisks. /
Citotoksisks. /
Tsütostaatikum.

1 flakonas / 1 flakons / 1 viaal
100 mg/5 ml



5 ml

FRESENIUS
KABI

7220088513

PC:
SN:
Lot:
EXP:
Overprinted Here
online with 2D Matrix

i.v.
Praskiestā vaistā lētai infuzuoti
j venā. / Ievadišanai lēnas
intravenozas infūzijas veidā,
iepriekš atšķaidot. / Aeglane
intravenoosne infusioon pārst
lahjendamist.
Citotoksišķas / Citotoksiķs /
Tsūtostaatikum

100 mg/5 ml

Etoposide Kabi 20 mg/ml

koncentrats infuziniam tirpalui / koncentrāts infūziju
šķīduma pagatavošanai / infusioonilahuse kontsentraat

Etoposidum



7220198188 Code No.: HP/156/06

Lot:
EXP: