

20 mg/ml

## Propoven 2 %

injekcinē ar infuzinē emulsija / sūste-/infusiooniemulsioon

propofolum, Kiekvienāme ml yra 20 mg propofolio, Kiekvienāme 50 ml flakone yra 1000 mg propofolio. Ūks ml sisaldab 20 mg propofoli, Ūks 50 ml vialā sisaldab 1000 mg propofoli. Soiae oleum raffinatum, Triglycerida saturata media, Phosphatidum ovi deparatum, Glycerolum, Acidum oleicum, Natrii hydroxidum, Aqua ad iniectionem.

Leisti jvenā, Prieš vartojimą talpykle pakratyti. Vartoti tik homogenišką emulsiją. Pakuotė turi būti nepažeista. Vienkartiniam vartojimui vienam pacientui. Vartojant kelis kartus, kyla septišio rizika. Po pavartojimo emulsijos likučius reikia sunaikinti. Vartoti tik aseptiškai. Prieš vartojimą guminių kamščių būtinai dezinfekuoti: užpurkšti alkoholio arba nuvalyti alkoholyje suvilgytu vatos gabalėliu. Prieš vartojimą persikaitkite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamose vietose. Atidarius, suvartoti nedelsiant. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti. Receptinis vaistas. / Intravenoosne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Viale tuleb enne kasutamist toksutada. Kasutada vaid siis, kui emulsioon on ühtlane ja vialā on kahtustamata. Ühekordselt kasutamiseks ühel patsiendil. Sepsise risk korduvelt kasutamisel. Vialē ei ole mõeldud mitmekes kasutamiskorraks. Kasutamata jäänud ravim tuleb ära visata. Kasutada ainult aseptilistes tingimustes. Enne kasutamist tuleb kummimembraan alkoholipihusti või alkoholiga niisutatud tampooniga puhastada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Kasutada kohe pärast avamist. Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte lasta külmuda. Retseptiravim.

LT/1/05/0195/012  
Müügiloa nr: 460805

PC: 04052682062070

 **FRESENIUS  
KABI**  
Fresenius Kabi  
Deutschland GmbH  
D-61346 Bad Homburg v.d.H.  
Vokietija / Saksamaa

Lot:  
EXP:  
SN:

10 x 50 ml



M080739/003.LT/EE

20 mg/ml

## Propoven 2 %

injekciné ar infuziné emulsija / sūste-/infusiooniemulsioon

propofolum

Kiekvienamē ml yra 20 mg propofolio. Kiekvienamē 50 ml flakone yra 1000 mg propofolio. / Ūks ml sisaldab 20 mg propofooli. Ūks 50 ml viall sisaldab 1000 mg propofooli.

Soliae oleum raffinatum, Triglycerida saturata media, Phosphatidum ovi depuratum, Glycerolum, Acidum oleicum, Natrii hydroxidum, Aqua ad inieciabile.



Fresenius Kabi Deutschland GmbH  
Vokietija / Saksamaa

LT/1/05/0195/012  
EE 460805

Leisti j venā. Vienkartinām vartojimui vienam pacientim.  
Prieš vartojimą talpyklę suplakiti. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Atidarius, suvartoti nedelsiant. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti. Receptinis vaistas. Intravenoosne. Ūhekordseks kasutamiseks ūhel oatsiendil.

Viaale tuleb enne kasutamist loksutada. Hoida laste eest varjatum ja kaitesamatum kohas. Kasutada kohe pārast avamist. Hoida temperatūnii kuni 25°C. Mitte lasta kūlmuda. Retseptiravim.

Lot:

EXP:



M080729/02 LT/EE

50 ml