

M02840401.LT

10 mg/ml

Propoven 1 %
injekcinė ar infuzinė emulsija

Prėš vartojimą ampulė pakrątyti. Vartoti tik homogeniską emulsiją. Pakuotė turi būti nepažeista. Vienkartiniam vartojimui vienam pacientui. Vartojant kelis kartus, kyla sepsio rizika. Po pavartojimo emulsijos likučius reikia sunaikinti. Vartoti tik aseptiskai. Prėš vartojimą ampulės kakliuką būtina dezinfekuoti: užpurkšti alkoholio arba nuvalyti alkoholyje suvilgytu vatos gabaliu. Prėš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Atidarius, suvartoti nedelsiant. Praskiesto preparato tinkamumo laikas nurodytas pakuotės lapelyje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperaturoje. Negalima užšaldyti. Receptinis vaistas. LT/1/05/0195/001

Leisti į veną.

Propoven 1 %
injekcinė ar infuzinė emulsija

10 mg/ml

EXP:

Lot:

GTIN: 04052682057113

10 mg/ml

Propoven 1 %
injekcinė ar infuzinė emulsija
propofolum

Soiae oleum raffinatum, Triglycerida saturata media, Phosphatidum ovi depuratum, Glycerolum, Acidum oleicum, Natrii hydroxidum, Aqua ad iniectabile.

Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.
Kiekviename ml yra 10 mg propofolio.
Kiekvienoje 20 ml ampulėje yra 200 mg propofolio.


Fresenius Kabi Deutschland GmbH
D-61346 Bad Homburg v.d.H.
Vokietija

 5 x 20 ml

 **FRESENIUS
KABI**



 **FRESENIUS
KABI**

 5 x 20 ml

Propoven 1 %
injekcinė ar infuzinė emulsija

10 mg/ml

10 mg/ml

Propoven 1 %

injekcinė ar infuzinė emulsija

propofolum

Leisti į veną. Kiekviename ml yra 10 mg propofolio. Kiekvienoje 20 ml ampulėje yra 200 mg propofolio.

Vienkartiniam vartojimui vienam pacientui. Atidarius, suvartoti nedelsiant.

M08063802.LT



Lot:

EXP:



20 ml