

03 1242


EXP: MM-YYYY
Lot: 10XX1234

Pedismof Neo : Triju kameru maišelio (500 ml) sudėtis / tris kameru maiss (500 ml) satur/ kolmekambriľine kott (500 ml) sisaldab:

1. 19,6 % gliukozė / gliukozi / glükoois: Glucosum monohydratum as Glucosum 50,0 g.

2. 6,5% aminorūgštys su elektrolitais / aminoskābju šķidumu ar elektrolītiem / aminohappelahus

elektrolītiidega: Alaninum 1,2 g, Argininum 0,79 g, Acidum asparticum 0,79 g, Cisteinum 0,19 g, Acidum glutaminicum 1,4 g, Glicinum 0,40 g, Histidinum 0,40 g, Isoleucinum 0,59 g, Leucinum 1,3 g, Lysini monohydricus as Lysinum 1,1 g, Methioninum 0,25 g, Phenylalaninum 0,52 g, Prolinum 1,1 g, Serinum 0,73 g, Taurinum 0,057 g, Threoninum 0,69 g, Tryptophanum 0,27 g, Tyrosinum 0,096 g, Valinum 0,69 g, Calcii gluconas monohydricus as Calcii gluconas 2,5 g, Natrii glycerophosphas (hydricus) as Natrii glycerophosphas 1,1 g, Magnesii sulfas (heptahydricus) as Magnesii sulfas 0,086 g, Kalii chloridum 0,67 g.



3. 20 % lipidu emulsija SMOFlipid / Lipidu emulsiju, 20% (SMOFlipid) / SMOFlipid 20% lipidiemulsioon: Soiae oleum raffinatam 3,2 g, Triglycerida saturata media 3,2 g, Olivae oleum raffinatam 2,7 g, Piscis oleum omega-3-acidis abundans 1,6 g.

Natrii hydroxidum, Acidum aceticum glaciale, Glycerolum*, Phospholipida ovi purificata*, Int-rac-α-Tocopherolum*, Natrii oleatum*, Aqua ad iniectionem

*Tik lipidu kameroje / *tikai lipidu kamerā / *Ainult lipiidikambris

Approx.

400

200

100

341294 Ped178



Fresenius Kabi AB
Rapsatan 7
751 74 Uppsala
Švedija / Zviedrija / Rootsi

LT/1/25/5847/001
25-0218
Mūgiloa nr: 1217025



ADDITIVE PORT

Pedismof Neo

infuzinē emulsija / emulsija infūzijām / infusiooniemulsioon

500 ml

Su elektrolitais. / Ar elektrolītiem. / Sisaldab elektrolīte.

Leisti į venā, infuzuoti į centrinę venā. Tik vienkartiniam vartojimui.


Lipidų skyrimas nebūtinus. /

Intravenozai lietošanai, infūzijai centrālā venā. Tikai vienai infūzijai.

Lipidu ievadišana pēc izvēles. /

Intravenoosne, infusiooniks tsentraalveeni. Ainult ūhekordseks kasutamiseks.

Lipiidide manustamine on valikuline.



Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Prieš vartojimą atidarykite nuplėšiamą sandarikį ir paruoškite mišinį. Gliukozės kameros negalima naudoti atskirai. Sumaišius kamerų turinį, vaistą būtina vartoti nedelsiant. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti. Laikyti maišelyje su apvalkalu. Receptinis vaistas. Vartojant naujagimiams ir jaunesniems kaip 2 metų vaikams, tirpalą (maišeliuose ir vartojimo rinkiniuose) reikia saugoti nuo šviesos poveikio, kol bus baigta infuzija.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Pirms lietošanas atveriet atplēšamās starpsienas un samaisiet. Gliukozes kameras saturu nedrīkst ievadīt atsevišķi. Pēc samaisīšanas šķīdums jāizlieto nekavējoties. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Nesasaldēt. Uzglabāt ar virsējo pārvalku. Receptu zāles. Lietojot jaundzimušajiem un bērniem līdz 2 gadu vecumam, šķīdums (maisos un ievadīšanas komplektos) jāargā no gaismas iedarbības līdz ievadīšanas pabeigšanai.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Enne kasutamist avada lahtitõmmatavad vaheseinad ja segada kokku. Mitte manustada ainult glükooisikambri sisu. Pärast kokkusegamist tuleb ravim kohe ära kasutada. Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte lasta külmuda. Hoida kattekotis. Retseptiravim. Kui ravimpreparaati manustatakse vastsündinutele ja alla 2-aastastele lastele, tuleb lahust (kotis ja manustamissüsteemides) kaitsta valguse eest kuni manustamise lõpuni.



INFUSION PORT

Pedismof Neo 6 x 500 ml

infuzinē emulsija / emulsija infūzijām /
infusiooniemulsioon

CENTRAL

83 34 41-780

Su elektrolītais. / Ar elektrolītiem. / Sisaldab elektrolūte.

Leisti ī venā, infuzuoti ī centrīnē venā. Tik vienkartiniam vartojimui. Lipidū skyrimas nebūtinas. / Intravenozai lietošanai, infūzijai centrālā vēnā. Tikai vienai infūzijai. Lipīdu ievadīšana pēc izvēles. / Intravenoosne, infusiooniks tsentraalveeni. Ainult ūhekordseks kasutamiseks. Lipiidide manustamine on valikuline.

Pedismof Neo: Trijū kamerū maišelio (500 ml) sudētis / trīs kameru maiss (500 ml) satur / kolmekambriline kott (500 ml) sisaldab:

- 1. 19,6 % gliukoze / glikozi / gliukoos:** Glucosum monohydratum as Glucosum 50,0 g.
- 2. 6,5 % aminorūgštys su elektrolītais / aminoskābju šķīdumu ar elektrolītiem / aminohappelahus elektrolūūtidega:** Alaninum 1,2 g, Argininum 0,79 g, Acidum asparticum 0,79 g, Cisteinum 0,19 g, Acidum glutaminicum 1,4 g, Glycinum 0,40 g, Histidinum 0,40 g, Isoleucinum 0,59 g, Leucinum 1,3 g, Lysinum monohydricus as Lysinum 1,1 g, Methioninum 0,25 g, Phenylalaninum 0,52 g, Prolinum 1,1 g, Serinum 0,73 g, Taurinum 0,057 g, Threoninum 0,69 g, Tryptophanum 0,27 g, Tyrosinum 0,096 g, Valinum 0,69 g, Calcii gluconas monohydricus as Calcii gluconas 2,5 g, Natrii glycerophosphas (hydricus) as Natrii glycerophosphas 1,1 g, Magnesii sulfas (heptahydricus) as Magnesii sulfas 0,086 g, Kalii chloridum 0,67 g.
- 3. 20 % lipidū emulsija SMOFlipid / Lipīdu emulsiju, 20% (SMOFlipid) / SMOFlipid 20% lipīdiemulsioon:** Soiae oleum raffinatum 3,2 g, Triglycerida saturata media 3,2 g, Olivae oleum raffinatum 2,7 g, Piscis oleum omega-3-acidus abundans 1,6 g.

Natrii hydroxidum, Acidum aceticum glaciale, Glycerolum*, Phospholipida ovi purificata*, Int-rac- α -Tocopherolum*, Natrii oleatum*, Aqua ad iniectionem
*Tik lipidū kameroje / *tikai lipīdu kamerā / *Ainult lipīdikambris

Priē vartojimā perskaitykite pakuotēs lapelj. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Priē vartojimā atidarykite nuplēsiamā sandariklj ir paruoškite mišinj. Gliukozes kameras negalima naudoti atskirai. Sumaišius kamerū turinj, vaistā būtina vartoti nedelsiant. Laikyti ne aukštesnēje kaip 25 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti. Laikyti maišelyje su apvalkalu. Receptinis vaistas. Vartojant naujagimiams ir jaunesniems kaip 2 metų vaikams, tirpalą (maišeliuose ir vartojimo rinkiniuose) reikia saugoti nuo šviesos poveikio, kol bus baigta infuzija.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Pirms lietošanas atveriet atplēšamās starpsienas un samaisiet. Gliukozes kameras saturu nedrīkst ievadīt atsevišķi. Pēc samaisīšanas šķīdums jāizlieto nekavējoties. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Nesalsdēt. Uzglabāt ar virsējo pārvalku. Receptu zāles. Lietojot jaundzimušajiem un bērniem līdz 2 gadu vecumam, šķīdums (maisos un ievadīšanas komplektos) jāsaugā no gaismas iedarbības līdz ievadīšanas pabeigšanai.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Enne kasutamist avada lahtitõmmatavad vaheseinad ja segada kokku. Mitte manustada ainult gliukoosikambri sisu. Pärast kokkusegamist tuleb ravim kohe ära kasutada. Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte lasta külmuda. Hoida kattekotis. Retseptiravim. Kui ravimpreparaati manustatakse vastsündinutele ja alla 2-aastastele lastele, tuleb lahust (kotis ja manustamissüsteemides) kaitsta valguse eest kuni manustamise lõpuni.

Fresenius Kabi AB, Rapskatan 7, 751 74 Uppsala
Švedija / Zviedrija / Rootsi

LT/1/25/5847/001
25-0218
Müügiloa nr: 1217025


 **Fresenius**
Kabi

Pedismof Neo 6 x 500 ml


infuzinē emulsija / emulsija infūzijām /
infusiooniemulsioon

CENTRAL

EXP: MM-YYYY
Lot: 10XX1234
X1234567L



450747 / 01



30000000