

03 1242



EXP: MM-YYYY

Lot: 10XX1234



## Pedismof Junior

infuzinē emulsija / emulsija infūzijām / infusiooniemulsioon

**CENTRAL**  
1000 ml

Su elektrolītais. / Ar elektrolītiem. / Sisaldab elektrolūte.

Leisti j venā, infuzuoti j centrīnē venā. Tik vienkartinām vartojīmūi. Lipīdū skyrimas nebūtinās. / Intravenozai lietošanai, infūzijai centrālā vēnā. Tikai vienai infūzijai. Lipīdū ievadīšana pēc izvēles. / Intravenoosne, infusiooniks tsentraalveeni. Ainult ūhekordseks kasutamiseks. Lipīdīde manustamine on valikulīne.

Approx.

750

500

250

Fresenius Kabi AB  
Rapsgatan 7  
751 74 Uppsala  
Švedija / Zviedrija / RootsiLT/1/25/5848/001  
25-0219  
Mūūgīloa nr. 1216825

341296 Ped278

**Pedismof Junior: Trijū kamerū maišelio (1000 ml) sudētīs / 3 kamerū maiss (1000 ml) satur / kolmekambriīne kott (1000 ml) sisaldab:**

- 18,2 % gliukozē / glikozi / glūkoos: Glucosum (monohydratum) as Glucosum 104 g.
- 6,5 % aminorūgštys su elektrolītais / aminoskābju šķīdumu ar elektrolītiem / aminoskābju elektrolūtiem: Alaninum 2,0 g, Argininum 1,3 g, Acidum asparticum 1,3 g, Cisteinum 0,32 g, Acidum glutaminicum 2,3 g, Glycinum 0,67 g, Histidinum 0,67 g, Isoleucinum 0,99 g, Leucinum 2,2 g, Lysinum 1,8 g, Methioninum 0,42 g, Phenylalaninum 0,86 g, Prolinum 1,8 g, Serinum 1,2 g, Taurinum 0,096 g, Threoninum 1,2 g, Tryptophanum 0,45 g, Tyrosinum 0,16 g, Valinum 1,2 g, Calci gluconas monohydricus as Calci gluconas 4,3 g, Natrii glycerophosphas (hydricus) as Natrii glycerophosphas 2,2 g, Magnesium sulfas (heptahydricus) as Magnesium sulfas 0,30 g, Kalii chloridum 1,9 g, Natrii acetat (trihydricus) as Natrii acetat 0,59 g.
- 20 % lipīdū emulsija SMOFlipid / Lipīdū emulsijū, 20% (SMOFlipid) / SMOFlipid 20% lipīdiemulsioo: Soiae oleum raffinatum 6,5 g, Triglycerida saturata media 6,5 g, Olivae oleum raffinatum 5,4 g, Piscis oleum omega-3-acidus abundans 3,3 g.

100 ml galutinio mišinio sudētīs / Gatavās maistjums satur (uz 100 ml) / 100 ml valmissegu sisaldab:

	Suaktyvintās dviejū kamerū maišelis / Aktivizēts divu kamerū maiss / Kahe aktiveeritūd kambriga kott	Suaktyvintās trijū kamerū maišelis / Aktivizēts trīs kamerū maiss / Kolme aktiveeritūd kambriga kott
Aminorūgštys / Aminoskābes / Aminohapped (g)	2,3	2,1
Azotas / Slāpekliis / Lāmmastik (g)	0,37	0,33
Elektrolītai / Elektrolīti / Elektrolūtid (mmol)		
- nātris / nātrijs / naatrium <sup>1</sup>	2,0	1,9
- kalis / kālijs / kaalium	1,9	1,7
- magnis / magnijs / magneesium	0,19	0,17
- kalcis / kalcijs / kaltsium	0,75	0,67
- fosfatas / fosfāti / fosfaat <sup>1</sup>	0,75	0,83
- sulfatas / sulfāti / sulfaat	0,19	0,17
- chloridas / hlorīdi / klorid	1,9	1,7
- acetatas / acetāti / atsetaat	1,0	0,90
Angliavandēni / Ogļhidrāti / Sūsviesikud (g)		
- Gliukozē (bevdanē) / Gliukoze (bezdēns) / Glūkoos (veevaba)	11,7	10,4
Lipīdai / Lipīdi / Lipīdid (g)	-	2,2
Energijās kiekis (kcal) / Energijas daudzums (kcal) / Energeetiīne vāārtus (kcal)		
- īs viso (apytiksliai) / kopējais (aptuveni) / kokku (līgikaudu)	56,1	71,8
- ne baltymai (apytiksliai) / neproteīnu (aptuveni) / mittevalgulīne (līgikaudu)	46,7	63,4
Osmolāriškumas (apytiksliai) / Osmolāritāte (aptuveni) / Osmolaarsus (līgikaudu)	940 mOsm/l	860 mOsm/l
pH	5,6	5,6

<sup>1</sup> Prīsidea īs lipīdū emulsijās ir aminorūgščiū tirpalo./Lipīdū emulsijās un aminoskābju šķīduma devums./Lipīdiemulsioonis ja aminoskābju kokku. Natrii hydroxidum, Acidum aceticum glaciale, Glycerolum\*, Phospholipida ovi purificata\*, Int-rac-α-tocopherolum\*, Natrii oleatum\*, Aqua ad iniectionem  
\*Tik lipīdū kamerōje / \*tikai lipīdū kamerā / \*Ainult lipīdikambris

ADDITIVE PORT

Priēs vartojīmā perskaitīkite pakotēs lapelī. Laiķyti vaikas nepastebīmōje ir nepasiekīmōje vietōje. Priēs vartojīmā atīdārykite nuplēšīamus sandāriķliis ir paruošķite mišinī. Priēdus būtīna ruošķi aseptīšķai. Gliukozes kamerōs negālīma naudoti atskīrai. Vartoti īsnešīotiems naujāgīmīams, kūdīkiams, vaīkams ir paaugliams. Sumāīšius kamerū turīnī, vaīstā būtīna vartoti nedēlsīant. Laiķyti ne aukštēsneķe kaip 25 °C temperatūrōje. Negālīma užsaldīyti. Laiķyti maišēlyje su apvalkalu. Nesuvartotā vaīsto līkuķī po infūzījōs būtīna īspīlīti. Receptīnis vaīstas. Vartojānt naujāgīmīams ir jaunēsniems kaip 2 metū vaīkams, tirpalā (maišeliuose ir vartojīmō rīnkīniuose) reīķia saugoti nuo švīesos poveīķio, kol bus baigta infūzīja.

Pīrms lietošanas īzlasīet lietošanas īnstrukcīju. Uzglābāt bērīm neredzamā un nepīeējamā vietā. Pīrms lietošanas atverīet atplēsamās stārpšīenas un samāīset. Pīedēvas jāpīevīeno aseptīskos apstāķķos. Gliukozes kamerōs saturu nedrīķst īvadīt atsevīšķī. Lietošanai laikā dzīmūšīem jaunūdzīmūšīem, zīdāīnīem, bērīm un pusaudzīm. Pēc samāīšīanas šķīdūms jāīzīlieto nekavējoties. Uzglābāt temperatūrā līd 25 °C. Nesasaldēt. Uzglābāt ar vīrsējo pārvāķu. Pēc infūzījas atīķušķās neīzīlietotās zāles jāīzīle. Receptīsu zāles. Lietojot jaunūdzīmūšīem un bērīm līd 2 gadu vecumam, šķīdūms (maīso un īvadīšanas komplektos) jāsarģā no gāīsmas īedarbības līd īvadīšanas pabeģīšanai.

Enne ravīmī kasutamīst lugeģe pakēndī īnfolēhte. Hoida laste eest varjatud ja kāttēsaamatus kohas. Enne kasutamīst avada lahtītmātavād vahēsēīnad ja segada kokku. Lisandīd tūleb līsada aseptīlīstēs īngīmūstēs. Mītte manustada ainult glūkoosīkambrī sīsu. Kasutamīseks ājalīstel vastsūndīnutel, īmīķitel, lastel ja noorūķitel. Pārst kokkuseģamīst tūleb ravīmī koģe āra kasutada. Hoida temperatūrii kuni 25 °C.

Mītte lasta kūlmda. Hoida kattekotīs. Pārst infusiooni alles jāānūd ravīmīpreparaat tūleb hāvītada. Retseptīravīmī. Kūi ravīmīpreparaatī manustataķse vastsūndīnutele ja alla 2-aastastele lastele, tūleb lahust (kotīs ja manustamīssūsteemīdēs) kaitsta valģuse eest kuni manustamīse lōpūni.

INFUSION PORT

# Pedimof Junior 6 x 1000 ml

infuzinē emulsija / emulsija infūzijām / infusiooniemulsioon

CENTRAL

83 34 42-780

Su elektrolītais. / Ar elektrolītiem. / Sisaldab elektrolūīte.

Leisti j venā, infuzuoti j centrīnē venā. Tik vienkartinām vartojīmui. Lipīdū skyrimas nebūtinās. / Intravenozai lietošanai, infūzijai centrālā vēnā. Tikai vienai infūzijai. Lipīdū ievadīšana pēc izvēles. / Intravenoosne, infusiooniiks tsentraalveeni. Ainult ūhekordseks kasutamiseks. Lipīdīde manustamine on valikulīne.

Pedimof Junior: Trijū kamerū maišēlio (1000 ml) sudētīs / trīs kameru maiss (1000 ml) satur / kolmekambrīlīne kott (1000 ml) sisaldab:

**1. 18,2 % gliukoze / glikozi / gliukoos:** Glucosum (monohydratum) as Glucosum 104 g.

**2. 6,5 % aminorūgštys su elektrolītais / aminoskābju šķīdumu ar elektrolītiem / aminohappelahus elektrolūīte:** Alaninum 2,0 g, Argininum 1,3 g, Acidum asparticum 1,3 g, Cisteinum 0,32 g, Acidum glutaminicum 2,3 g, Glycerinum 0,67 g, Histidinum 0,67 g, Isoleucinum 0,99 g, Leucinum 2,2 g, Lysinum monohydricus as Lysinum 1,8 g, Methioninum 0,42 g, Phenylalaninum 0,86 g, Prolinum 1,8 g, Serinum 1,2 g, Taurinum 0,096 g, Threoninum 1,2 g, Tryptophanum 0,45 g, Tyrosinum 0,16 g, Valinum 1,2 g, Calcii gluconas monohydricus as Calcii gluconas 4,3 g, Natrii glycerophosphas (hydricus) as Natrii glycerophosphas 2,2 g, Magnesii sulfas (heptahydricus) as Magnesii sulfas 0,30 g, Kalii chloridum 1,9 g, Natrii acetat (trihydricus) as Natrii acetat 0,59 g.

**3. 20 % lipīdū emulsija SMOFlipid / Lipīdū emulsiju, 20% (SMOFlipid) / SMOFlipid 20% lipīdiemulsioon:** Soiae oleum raffinatum 6,5 g, Triglycerida saturata media 6,5 g, Olivae oleum raffinatum 5,4 g, Piscis oleum omega-3-acidus abundans 3,3 g. 100 ml galutinio mišīnio sudētīs / Gatavais maisījums satur (uz 100 ml) / 100 ml valmisegu sisaldab:

	Suaktyvintās dviejū kamerū maišēlis / Aktivizēts divu kameru maiss / Kahe aktiveeritud kambriga kott	Suaktyvintās trijū kamerū maišēlis / Aktivizēts trīs kameru maiss / Kolme aktiveeritud kambriga kott
Aminorūgštys / Aminoskābes / Aminohapped (g)	2,3	2,1
Azotas / Slāpekliis / Lāmmastik (g)	0,37	0,33
Elektrolītai / Elektrolīti / Elektrolūīdīd (mmol)		
- nātris / nātrijs / naatrium <sup>1</sup>	2,0	1,9
- kalis / kālijs / kaalium	1,9	1,7
- magnis / magnijs / magneesium	0,19	0,17
- kalciis / kalcijis / kaltsium	0,75	0,67
- fosfatas / fosfāti / fosfaat <sup>1</sup>	0,75	0,83
- sulfatas / sulfāti / sulfaat	0,19	0,17
- chlorīdas / hlorīdi / kloriīd	1,9	1,7
- acetatas / acetāti / atsetaat	1,0	0,90
Angliavandenīai / Ogļhidrāti / Sūsivesikud (g)		
- Gliukoze (bevangenē) / Glikoze (bezūdens) / Glūkoos (veevaba)	11,7	10,4
Lipīdai / Lipīdi / Lipīdīd (g)	-	2,2
Enerģijās kiekis (kcal) / Enerģijas daudzums (kcal) / Energieelīne vāartūs (kcal)		
- īš viso (apytikslīai) / kopējais (aptuveni) / kokku (līgikaudū)	56,1	71,8
- ne baltymai (apytikslīai) / neproteīnu (aptuveni) / mittevalgulīne (līgikaudū)	46,7	63,4
Osmolīarīškumas (apytikslīai) / Osmolārītāte (aptuveni) / Osmolaarsus (līgikaudū)	940 mOsm/l	860 mOsm/l
pH	5,6	5,6

<sup>1</sup> Prīsidea īš lipīdū emulsijās ir aminorūgštījū tīrpalo. / Lipīdū emulsijas un aminoskābju šķīduma devums. / Lipīdiemulsioonis ja aminohappelahuses kokku.

Natrii hydroxidum, Acidum aceticum glaciale, Glycerolum\*, Phospholipida ovi purificata\*, Int-rac- $\alpha$ -Tocopherolum\*, Natrii oleatum\*, Aqua ad iniectionem

\*Tik lipīdū kamerōje / \*tikai lipīdū kamerā / \*Ainult lipīdikambris

Priēš vartojīmā perskaitykite pakuoētīs lapelī. Laikyti vaikas nepastebīmōje ir nepasiekīmōje vietoje. Priēš vartojīmā atīdarykite nuplēšīamus sandarīklius ir paruoškite mišīnī. Priedus būtīna ruoštī aseptīškai. Gliukozeš kamerōs negalīma naudoti atskīrai. Vartoti īšnešīotiems naujagīmīams, kūdikīams, vaikas ir paauglīams. Sumaišīus kamerū turīnī, vaistā būtīna vartoti nedelsīant. Laikyti ne aukštēsneje kaip 25 °C temperatūroje. Negalīma užsaldyti. Laikyti maišēlyje su apvalkalu. Nesuvarotojā vaisto likutj po infūzijās būtīna īšplīti. Receptīnis vaistas. Vartojant naujagīmīams ir jaunēsniems kaip 2 metū vaikas, tīrpalā (maišēliuose ir vartojīmo rīnkīnuose) reikīa saugoti nuo švīesos poveikīo, kol bus baigta infūzīja.

Pīdevas jāpīevīeno aseptīskos apstākļos. Glīkozes kamerās saturu nedrīkst īvadīt atseviškī. Lietošanai laikā dzīmušīem jaundzīmušājiem, zīdāīnīem, bērīnīem un pusaudzīem. Pēc samaišīšanas šķīdums jāizlieto nekavējōties. Uzglabāt temperatūrā līd 25 °C. Nesasaldēt. Uzglabāt ar vīrsējo pārvalku. Pēc infūzījas atlikušās neizlietotās zāles jāizlej. Receptū zāles. Lietojot jaundzīmušājiem un bērīnīem līd 2 gadu vecumam, šķīdums (maisos un īvadīšanas komplektos) jāsarģā no gaismas īdarbības līd īvadīšanas pabeģīšanai.

Enne ravīmī kasutamīst lugeje pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kāttesaamatus kohas. Enne kasutamīst avada lahtītōmmatavad vaheseīnad ja segada kokku. Lisandīd tūleb līsada aseptīlīstes tīngīmūstes. Mīte manustada ainult glūkoosīkambrī sīsu. Kasutamīseks aģalīstel vastsūndīnutele, īmikutele, lastel ja noorkītele. Pārast kokkuseģarīmīst tūleb ravīmī kohe āra kasutada. Hoida temperatūru līd 25 °C. Mīte lasta kūlmuda. Hoida kattekotīs. Pārast infusiooni alles jāānūd ravīmīpreparāt tūleb hāvitada. Retseptīravīmī. Kūī ravīmīpreparātī manustatakse vastsūndīnutele ja alla 2-aastastele lastele, tūleb lahust (kotīs ja manustamīssūsteemīdes) kaitīsta valguse eest kūnī manustamīse lōpūnī.

Fresenius Kabi AB, Rapskatan 7, 751 74 Uppsala, Švedīja / Zvīdrija / Rootīs

LT/1/25/5848/001

25-0219

Mūģīloa nr: 1216825

 Fresenius  
Kabi

# Pedimof Junior 6 x 1000 ml


infuzinē emulsija / emulsija infūzijām / infusiooniemulsioon

CENTRAL


EXP: MM-YYYY

Lot: 10XX1234

X1234567L



450748 / 01



30000000