

30404236



ORIFARM

**Laryxin
Lemon**
2 mg/
0,5 mg/ml

chlorheksidino
digliukonatas/
lidokaino
hidrochloridas
monohidratas

Kiekviename išpurškime yra
0,17 mg chlorheksidino
digliukonato, atitinkančio
0,10 mg chlorheksidino, ir
0,043 mg lidokaino hidrochlorido
monohidrato, atitinkančio
0,035 mg lidokaino.
Etanolis (96%), propilenglikolis
(E 1520). Daugiau informacijos
pateikta pakuotės lapelyje.


**Laryxin
Lemon**
2 mg/
0,5 mg/ml

chlorheksidino
digliukonatas/
lidokaino
hidrochloridas
monohidratas

**GERKLĖS
SKAUSMO
SIMPTOMŲ
MALŠINIMUI**



30 ml
burnos gleivinės
purškimas (tirpalas)



ORIFARM

Laryxin Lemon sudėtyje yra
chlorheksidino, kuris pasižymi
bakterijas ir kitus mikroorganizmus
slopinančiu poveikiu. Laryxin Lemon
sudėtyje taip pat yra lidokaino, kuris
yra vietinis anestetikas.

Suaugusiems ir 12 metų bei
vyresniems paaugliams: gerklės
skausmo simptomų malšinimui.

Dozavimas

Suaugusiems: po 3–5 išpurškimus
į galinę gerklės dalį kas 2–3 valandas,
bet ne daugiau kaip 10 kartų per parą.
Paaugliams nuo 12 iki 18 metų: po
2–3 išpurškimus į galinę gerklės
dalį kas 2–3 valandas, bet ne
daugiau kaip 5 kartus per parą.

Jeigu per 3–4 dienas Jūsų
savijauta nepagerėjo arba net
pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.
Nevartokite vaisto nepertraukiamai
ilgiau kaip 5 dienas.

Tinkamumo laikas po pirmojo
atidarymo: 6 mėnesiai.

Vartoti ant burnos gleivinės.
Nukreipkite kandiklį į galinę
gerklės dalį ir paspauskite.
Prieš vartojimą perskaitykite
pakuotės lapelį.

Laikyti vaikams nepastebimoje
ir nepasiekiamoje vietoje.
Nereceptinis vaistas.

LT/1/24/5474/001

Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15, 5260 Odense S
Danija

100 x 45 x 42 mm

1000172632-002-01
30404236-X




5 711313 011441

Serija:

Tinka
iki:

30404236

Braille:**Artwork colors:****Signature:**AW
proof:

Filename: CN_Laryxin(Lemon)2+0,5-30-1000172632-002-01-LT
Date: 19-03-2026 MAFUG

Supplier: 23033 Qualiphar NV