

IBUSTAR® 40 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams

1 ml yra 40 mg ibuprofeno.

Sudėtyje yra skystojo maltilolio (E 965), natrio, natrio benzoato (E 211) ir benzilo alkoholio. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje. Geriamoji suspensija - Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Nereceptinis vaistas

Tinkamumo laikas pirmą kartą atidarius: 6 mėnesiai, jei laikomas žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Atidarymo data

LT/1/15/3829/002

BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Vokietija



100 ml geriamosios suspensijos

IBUSTAR®

40 mg/ml geriamoji suspensija,
vaikams

Ibuprofenas

Vaikams, sveriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiems.

Pakuotėje yra geriamasis švirkštas.

M BERLIN-CHEMIE MENARINI

Trumpalaikiam lengvo arba vidutinio stiprumo skausmo ir karščiavimo simptominiams gydymui.

Prieš vartojimą buteliuką supurtyti. Dozavimui prašome naudoti geriamąjį švirkštą. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Rekomenduojama dozė yra:

Kūno svoris (amžius)	Vienkartinė dozė	Maksimali paros dozė
10-15 kg (1-3 metų vaikai)	100 mg ibuprofeno (atitinka 2,5 ml suspensijos)	300 mg ibuprofeno (atitinka 7,5 ml suspensijos)
16-19 kg (4-5 metų vaikai)	150 mg ibuprofeno (atitinka 3,75 ml suspensijos)	450 mg ibuprofeno (atitinka 11,25 ml suspensijos)
20-29 kg (6-9 metų vaikai)	200 mg ibuprofeno (atitinka 5 ml suspensijos)	600 mg ibuprofeno (atitinka 15 ml suspensijos)
30-39 kg (10-11 metų vaikai)	200 mg ibuprofeno (atitinka 5 ml suspensijos)	800 mg ibuprofeno (atitinka 20 ml suspensijos)
≥ 40 kg (paaugliai nuo 12 metų ir suaugusieji)	200 mg – 400 mg ibuprofeno (atitinka 5 ml – 10 ml suspensijos)	1200 mg ibuprofeno (atitinka 30 ml suspensijos)

Pakuotėje yra geriamasis švirkštas.

M BERLIN-CHEMIE MENARINI

Vaikams, sveriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiems.

100 ml geriamosios suspensijos

IBUSTAR®

40 mg/ml geriamoji suspensija,
vaikams

Ibuprofenas

40 mg/ml geriamoji suspensija,
IBUSTAR®
40 mg/ml geriamosios suspensijos

V141730/01

LT

varnish free

i b u s t a r # d j m g ä u m l
g e r i a m o j i
s u s p e n s i j a

Serijs
Tinka iki

ONLY FOR PRINTERS:
1st page: view pdf
2nd page: print pdf

Ibustar 40 mg/ml oral suspension, for kids		BERLIN-CHEMIE MENARINI		Approved for printing:	
V-No.:	V141730/01	TW-No.:	196395	BC-No.:	21-2792
Package:	100 ml	Language:	Lithuanian		
Size:	62,5 x 50,5 x 119 mm	Weight:	N/A		
Printing colours:	1. Black 2. Cyan 3. Magenta 4. Yellow	Braille transcrip.:	ibustar 40 mg/ml geriamoji suspensija		
Font size:	7,5 pt	RUT:	N/A	RD-Code:	N/A
Group:	X0	Date:	16.09.21	Weise	
Add. Info:	UV-Varnish high glossy Embossing Alcañá				

IBUSTAR® 40 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams

1 ml yra 40 mg ibuprofeno.

Sudėtyje yra skystojo maltilolio (E 965), natrio, natrio benzoato (E 211) ir benzilo alkoholio. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje. Geriamoji suspensija - Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Nereceptinis vaistas

Tinkamumo laikas pirmą kartą atidarius: 6 mėnesiai, jei laikomas žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Atidarymo data

LT/1/15/3829/002

BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Vokietija



100 ml geriamosios suspensijos

IBUSTAR®

40 mg/ml geriamoji suspensija,
vaikams

Ibuprofenas

Vaikams, sveriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiems.

Pakuotėje yra geriamasis švirkštas.

M BERLIN-CHEMIE MENARINI

Trumpalaikiam lengvo arba vidutinio stiprumo skausmo ir karščiavimo simptominiams gydymui.

Prieš vartojimą buteliuką supurtyti. Dozavimui prašome naudoti geriamąjį švirkštą. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Rekomenduojama dozė yra:

Kūno svoris (amžius)	Vienkartinė dozė	Maksimali paros dozė
10-15 kg (1-3 metų vaikai)	100 mg ibuprofeno (atitinka 2,5 ml suspensijos)	300 mg ibuprofeno (atitinka 7,5 ml suspensijos)
16-19 kg (4-5 metų vaikai)	150 mg ibuprofeno (atitinka 3,75 ml suspensijos)	450 mg ibuprofeno (atitinka 11,25 ml suspensijos)
20-29 kg (6-9 metų vaikai)	200 mg ibuprofeno (atitinka 5 ml suspensijos)	600 mg ibuprofeno (atitinka 15 ml suspensijos)
30-39 kg (10-11 metų vaikai)	200 mg ibuprofeno (atitinka 5 ml suspensijos)	800 mg ibuprofeno (atitinka 20 ml suspensijos)
≥ 40 kg (paaugliai nuo 12 metų ir suaugusieji)	200 mg – 400 mg ibuprofeno (atitinka 5 ml – 10 ml suspensijos)	1200 mg ibuprofeno (atitinka 30 ml suspensijos)

Pakuotėje yra geriamasis švirkštas.

M BERLIN-CHEMIE MENARINI

Vaikams, sveriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiems.

100 ml geriamosios suspensijos

IBUSTAR®

40 mg/ml geriamoji suspensija,
vaikams

Ibuprofenas

40 mg/ml geriamoji suspensija,
IBUSTAR®
40 mg/ml geriamosios suspensijos

V141730/01

LT

varnish free

i b u s t a r # d j m g ä u m l
g e r i a m o j i
s u s p e n s i j a

Serija
Tinka iki

ONLY FOR PRINTERS:
1st page: view pdf
2nd page: print pdf

Ibustar 40 mg/ml oral suspension, for kids		BERLIN-CHEMIE MENARINI		Approved for printing:	
V-No.:	V141730/01	TW-No.:	196395	BC-No.:	21-2792
Package:	100 ml	Language:	Lithuanian		
Size:	62,5 x 50,5 x 119 mm	Weight:	N/A		
Printing colours:	1. Black 2. Cyan 3. Magenta 4. Yellow	Braille transcrip.:	ibustar 40 mg/ml geriamoji suspensija		
Font size:	7,5 pt	RUT:	N/A	RD-Code:	N/A
Group:	X0	Date:	16.09.21	Weise	
Add. Info:	UV-Varnish high glossy Embossing Alcalá				

100 ml
geriamosios suspensijos



IBUSTAR

40 mg/ml geriamoji suspensija,
vaikams

Ibuprofenas



Vaikams, sveriantiems 10 kg ir daugiau
(1 metų ir vyresniems), paaugliams
ir suaugusiesiems.

V141731/01

Trumpalaikiam lengvo arba vidutinio stiprumo skausmo ir karščiavimo simptominiam gydymui.

1 ml yra 40 mg ibuprofeno. Sudėtyje yra skystojo maltitolio (E965), natrio benzoato (E 211) ir benzilo alkoholio. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje. Geriamoji suspensija - Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Prieš vartojimą buteliuką supurtyti. Dozavimui prašome naudoti geriamąjį švirkštą. Nereceptinis vaistas.

Tinkamumo laikas pirmą kartą atidarius:
6 mėnesiai, jei laikoma žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125,
12489 Berlin, Vokietija

LT/1/15/3829/002



BERLIN-CHEMIE
MENARINI

Atidarymo data

Serija
Tinka iki

varnish free

Ibustar40mg-ml_100ml_LT_V141731-01.indd 1

16.09.21 10:05

Ibustar 40 mg/ml oral suspension, for kids



BERLIN-CHEMIE
MENARINI

V-No.:	V141731/01	TW-No.:	196395	BC-No.:	21-2793	Approved for printing:		
Package:	100 ml	Language:	Lithuanian					
Size:	120 x 50 mm	Weight:	N/A					
Printing colours:	1. Black 3. Magenta	2. Cyan 4. Yellow	Braille transcrip.:	N/A				
Font size:	7,5 pt	Group:	N/A	RUT:	N/A		RD-Code:	N/A
Add. Info:	Alcalá	Date:	16.09.21	Weise				