



Metafenex
10 plėvele dengtų tablečių
10 apvalkotas tabletes

Neteipintis vaistas. Išeikvotoje plėvele dengtoje tabletyje yra 500 mg paracetamolio ir 200 mg ibuprofeno. Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakutes lapelį, kaitlyviamą nepasibaigusiamoje vietoje. Metafenex vartojamas suaugusiųjų trumpalaikiam simptominiam lengvo ar vidutinio stiprumo skausmo, siejamu su migrena, galvos skausmu, nugaros skausmu, mėšinių skausmu, dantų skausmu, reumatiniu bei raumenų skausmu, nestipriu artrito skausmu, persalimo ir gripo simptomais, gerklės (ryklės) skausmu bei gerklės 1 tablete (arba 2 tabletes, jei reikia, 60 kg ir daugiau svėrančių pacientams) užgeriant vandeniui vartojimo metu iki 3 kartų per dieną. Tarp dozių pakilite maziąsiai 6 valandų pertrauką ir nevartokite daugiau kaip 6 tablečių per 24 valandas. Nevartokite vaisto ilgiau kaip 3 dienas. LT/1/21/4805/001

21-0139

Zales nendrkst lietot ilgiau kaip 3 dienas. Vartokite par 6 tabletem 24 stundu peroda. edenu. Starp devam jadt vismaz 6 stundu peroda. vai vaitek, ja nepieciešams) līdz 3 reizem diena kopā ar ūdeni un Lieotiet 1 tableti (vai 2 tabletes pacientiem ar ķermena masu 60 kg artrta izraistū sapju arstēšanai, saukskēšanās un gripas simptomu novēršanai, kakla iekaisuma un drudzā arstēšanai. vai vidēji stipri ar migrenu saistītu sapju, galvasapsāpju, muguras sāpju, menstruālo sāpju, zobu sāpju, reimātisko un muskuļu sāpju, un vieglā

• Paaugusjiem Metafenex ir lietojams īslaicīgai simptomātiskai vieglai nepasibaigusiamo vietoje.

• Paaugusjiem Metafenex ir lietojams īslaicīgai simptomātiskai vieglai nepasibaigusiamo vietoje.

• Paaugusjiem Metafenex ir lietojams īslaicīgai simptomātiskai vieglai nepasibaigusiamo vietoje.

• Paaugusjiem Metafenex ir lietojams īslaicīgai simptomātiskai vieglai nepasibaigusiamo vietoje.

Bezreceptu zales. Katra apvalkota tablete satur 500 mg paracetamola un 200 mg ibuprofena. Iekskājai lietot. Pirms lietozanas izlasiet lietozanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Serija:
Lot:
Tinka iki:
EXP:

Metafenex
10 plėvele dengtų tablečių
apvalkotas tabletes

Sudėtyje yra paracetamolio. Didesnės nei rekomenduojamos dozės gali sukelti sunkų kepenų pažeidimą. Nevartokite Metafenex, jei jau vartojate kitų skausmą malšinančių vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio.

Satur paracetamolio. Devas, kas lielākas par ieteicamajām, var izraisīt nopietnu aknu bojājumu. Nelietojiet Metafenex, ja jau lietojat citus paracetamolū saturošus pret sāpju līdzekļus.

KMTF-2110-800

Metafenex
10 plėvele dengtų tablečių
10 apvalkotas tabletes

Metafenex

500 mg/200 mg plėvele dengtos tabletes
500 mg/200 mg apvalkotas tabletes
paracetamolium/ibuprofenum

Karščiavimų mažinantis,
priešuždegiminis,
skausmą malšinantis vaistas

Pretdrudža,
pretiekaisuma,
pretsāpju līdzeklis

polpharma
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pełplińska 19,
83-200 Starogard Gdański
Lenkija / Polija



Zapis w systemie Braille'a /
Braille inscriptions



Material / Material:	PUDEŁKO Z NADRUKIEM / BOX WITH OVERPRINT / ПАЧКА С ПЕЧАТЬЮ								
Wzór / Artwork:	KMTF-2110-800_1 (70x25x104 mm)			Kolorystyka i uwagi/ Colours and comments	Pantone 877 C Pantone 220 C Pantone 639 C Pantone Black C Pantone 206 C				
Preparat / Product:	Metafenex 500 mg/200 mg x 10 szt. /PP2, 12, 13/								
Min. Rozmiar czcionki/ Min. font size:	7 p	Interlinia/ Interline spacing:	3 mm	Farmakod/ Pharmacode:	579	Format strony/ Page format:	A4	Opracował/ Prepared by:	25.10.2024 K.Ceglecka



FMTF-4576-000

Material / Material:		FOLIA / FOIL / ФОЛЬГА								
Wzór / Artwork:		FMTF-4576-000_1 (96x66 mm)			Kolorystyka i uwagi/ Colours and comments	Skok modułu/ Spacing modules: 24 mm				
Preparat / Product:		Metafenex 500 mg/200 mg			■ P Black C	LOT/EXP - Dane nanoszone w trakcie produkcji LOT/EXP - Data put during production process				
Min. Rozmiar czcionki/ Min. font size:	8 pt	Interlinia/ Interline spacing:	3 mm	Farmakod/ Pharmacode:	-	Format strony/ Page format:	A4	Opracował/ Prepared by:	30.10.2024 K.Ceglecka	