

Sudėtis: Kiekviename kapsule yra 500 mg paracetamolio. Sudėtyje yra sorbitolio, propilenglikolio ir sojų lecitino. Daugiau informacijos žr. pakotės lapelyje.

Indikacijos: Simptominiam silpno arba vidutinio stiprumo skausmo ir (arba) karščiavimo gydymui. (arba) karščiavimo gydymui.

Įspėjimai: Sudėtyje yra paracetamolio. Neviršykite nurodytos dozės. APAP express negalima vartoti kartu su kitais skausmą malšinančiais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio. Didesnės nei rekomenduojamos dozės gali pakenkti kepenims. Perdozavus būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją net tuo atveju, jeigu jaučiatės gerai.

Laikymo sąlygos: Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje.

EXP: Lot:

APAP[®] express 10 minkštųjų kapsulių
500 mg minkštosios kapsulės paracetamolis

APAP[®] express 10 minkštųjų kapsulių
500 mg minkštosios kapsulės paracetamolis

Indikacijos: Simptominiam silpno arba vidutinio stiprumo skausmo ir (arba) karščiavimo gydymui.

Registruotojas
US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław
Lenkija

Nereceptinis vaistas
LT/1/22/5043/005

USP

5 904569 252472

STUDIO lobo LT_ApapExp_box10
2024_06_07 v. 6


print colors: cmyk + Pantone 186 C + Pantone 286 C


varnish matte varnish UV glossy

Braille Embossing

cutter IMS20: 61,25x29,00x107,50 mm pharmacode: 488 ■■■■■■



	LT_ApapExp_alu	
	2024_03_26	v. 3

Pantone 2728 C 
--

czcionka	interlinia	wersja	data
≥ 7 pkt Didota	≥ 3 mm	LT_ApapExp_alu_v. 3	2024_03_26

belt_1: 500 x 118 mm; cutter: 56 x 102 mm