

**Sandostatīn®** 100 mikrogramu/ml  
 100 mikrogramu/ml  
 100 mikrogramu/ml  
 5 ampulli, igas 1 ml  
 5 ampulas pa 1 ml  
 5 ampulēs po 1 ml







**Sandostatīn®** 100 mikrogramu/ml  
 100 mikrogramu/ml  
 100 mikrogramu/ml  
 5 ampulli, igas 1 ml  
 5 ampulas pa 1 ml  
 5 ampulēs po 1 ml

1 ml iahust sisaldab 100 mikrogrammi oktreotīdi (atsaetadīna). Abiained: piimhape, mannitool (E421), naatriumvesinikkarbonaat, süsivesi. Lisainot vaata pakendi infolihnest. Subkutaansēks sūsteks vōi intravenoosēks infusioonis. Emre intravenooset kasutamist laiņjedada. Lugege pakendi infolihste laiņjedatuid ravimi salivusajai kohtai. Unekordēks kasutamiseks. Kasutamata sūsi hāvitada. Hoida lāste eest varjatuid ja kaitesarmatus kohtas. Hoida kuldikapsis (2°C...8°C). Miltte lāste kuldmuada. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstuid. Vōib hoida temperatūru 10-30°C kuni 2 hādālat. Emre ravimi kasutamist lugege pakendi infolihste. Rēseptiravim EE Z17498


1 ml satur 100 mikrogramus oktreotīda (acetāta sāls veidā). Satur arī: pienskābi, mannitu (E421), nātrija hīdrogenkarbonātu, ūdeni injekcijām, šikaku informāciju skaiti lietošanas instrukcijā. Lietošana zem ādas un intravenozi. Pirms intravenozas lietošanas atšķaidīt, uzglabāšanas laiku atšķaidītām zālēm skaiti lietošanas instrukcijā. Vienreizējai lietošanai. Neizlietotās zāles jāizmet. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt 2°C – 8°C temperatūrā. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Var uzglabāt līdz divām nedēļām temperatūrā līdz 30°C. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Receptu zāles, LV Reģ. Nr.: 94-0058

1 ml tirpalo vāra 100 mikrogramu oktreotīdo (oktreotīdo acetāto pavaiālu). Pagalbinēs medzīagos: pieno rūgstis, mantolis (E421), nātrio-vandeniho karbonāts, injekcinis vanduo. Daudzāiu informācijas pateikta pakuoēs lapelēje. Leisti po oda ir i vena. Pries laižiant i venā praskesti. Ape preskiesto vaisto gallojima perskaitykite pakuoēs lapeli. Vienkardimam naudojimui. Vaisto likubūs ismeskite. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepastebimoje vietoje. Laikyti šalcytyve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti. Galima laikyti ne aukštesneje kaip 30 °C temperatūroje ne ilgiau kaip 2 savaites. Pries vartojima perskaitykite pakuoēs lapeli. Receptinis vaistas. LT/1/94/1033/001

SIA Novartis Baltics, Skanstes iela 25, LV-1013, Rīga, Lāti/Latvija



SN  
 Lot  
 EXP




PC 076127970702828506

**Sandostatīn®** 100 mikrogramu/ml  
 100 mikrogramu/ml  
 100 mikrogramu/ml  
 Süste-/infusioonilahus  
 šķīdums injekcijām/infūzijām  
 injekcinis ar infuzinis tirpalas  
 octreotidum




Süste-/infusioonilahus. 5 ampulli, igas 1 ml  
 Šķīdums injekcijām/infūzijām. 5 ampulas pa 1 ml  
 Injekcinis ar infuzinis tirpalas. 5 ampulēs po 1 ml

**NOVARTIS**



\* 711766 \*



711766  
 R07

