11752781-08_ETOPO DST LT-PD1.pdf 1 04.01.19 13:16

SANDOZ
a Novartis company

ETOPOSID
EBEWE

1 flakonas 100 mg (5 ml)
Etoposid
EBEWE
20 mg/ml
koncentratas
infuziniam tirpalui
Etopozidas
Leisti į veną.
Citostatinis vaistas
100 mg
SANDOZ A Novartis Division

Citostatinis vaistas. Vienkartinio vartojimo vaistas. Praskiestą vaistą reikia leisti nedelsiant. Galima leisti tik skaidrų tirpalą, kuriame matomų dalelių nėra. Dėl vaisto sudėtyje esančio etanolio poveikio gali kisti budrumas, todėl vairuoti ar valdyti mechanizmų nereikėtų.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Sandoz d.d.
Verovškova 57
SI-1000 Ljubljana
Slovėnija

9 088881 303596

11752781-08

1 flakonas 100 mg (5 ml)
Etoposid
EBEWE 20 mg/ml
koncentratas
infuziniam tirpalui
Etopozidas
Leisti į veną.
Citostatinis vaistas
100 mg
SANDOZ A Novartis Division

1 ml koncentrato infuziniam tirpalui yra 20 mg etopozido. Pagalbinės medžiagos: benzilo alkoholis, etanolis, bevandenė citrinų rūgštis, makrogolis 300, polisorbatas 80.
Leisti tik praskiestą tirpalą.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Nesuvartotą vaistą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.
Receptinis vaistas.

LT/1/96/1992/002

1 flakonas 100 mg (5 ml)
Etoposid
EBEWE 20 mg/ml
koncentratas
infuziniam tirpalui
100 mg
SANDOZ A Novartis Division

1 flakonas 100 mg (5 ml)
Etoposid
EBEWE
20 mg/ml
Lot
EXP

11732090-04_ETOPO DST LT-PD1.pdf 1 04.01.19 13:18

100

100 mg/5 ml

Etoposid EBEWE 20 mg/ml

koncentratas infuziniam tirpalui

Etopozidas

Leisti į veną.

Prieš vartojimą praskiesti.

Sandoz d.d.

SANDOZ A Novartis Division

11732090-04

Lot

EXP