

D3Z4680C2

Ⓜ Kiekvienam pakētelī (6,4 g) ir 1000 mg paracetamola, 10 mg fenilefrīna hidrochlorīda un 40 mg askorbīna rūgštes. Sudrasti ir saharozes un nātrija. Daugiau informācijas pateikta pakotēs lapelī. Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Nereceptinis vaistas. LT/1/95/1561/008

Ⓜ Ūks pakīke (6,4 g) sīsdab 1000 mg paracetamola, 10 mg fenūlefrīnīvesīniklorīdī ja 40 mg askorbīnīhapet. Sīsdab saharoosī ja nātrīumīt. Līsfīnot vt pakēndī īnfolēhest. Hoida temperatūurīl kūnī 25 °C. Kāsīmūūgīravīm. Mūūgīloa nr: 388502

Ⓜ Katra pacīna (6,4 g) satur 1000 mg paracetamola, 10 mg fenīlefrīna hīdrohlorīda un 40 mg askorbīnskābes. Satur saharozī un nātrīju. Sīkāku īnformāciju skatīt līetošanas īnstrukcijā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25° C. Bezrecepšu zāles. LV Reg. Nr.: 03-0233.

Regīstruotojas / Mūūgīloa hoidja / Regīstrācijas aplīecības īpašnīeks: Richard Bittner AG, Reīsenstraße 55-57, A-1030 Wīen, Austrija / Austria / Austria

# COLDREX®

## MAX GRIP

LEMON

Paracetamolum/  
Phenylephrini  
hydrochloridum/  
Acidum  
ascorbicum



1000 mg / 10 mg / 40 mg  
miltelīai gerīamajam tīrpalū/suūkaudse lahuse pulber/  
pulverīs īekšgīgī lītojamā  
šķīduma pagatavošanai

10 PAKETĒLIU  
PAKĪKĒST  
PACĪNAS

# COLDREX®

## MAX GRIP

LEMON



10 PAKETĒLIU  
PAKĪKĒST  
PACĪNAS



10 PAKETĒLIU  
PAKĪKĒST  
PACĪNAS

# COLDREX®

## MAX GRIP

LEMON

Perrigo®

CITRINŪ SKONĪO  
SIDRUNĪMĪTSELĪNE  
AR CITRONA GARSŪ

# COLDREX®

## MAX GRIP

LEMON

INDIKĀCIJOS / NĀIDUSTUSED / INDIKĀCIJAS

Trūmpalaīks pērsalīmo īr grīpo sīptomū (karščiavīmo, slogos īr skausmo) lēngvīnīmas / Lūhīajalīne palavīku alandamīne, nōrga valū lēevēndamīne ja nohu sīptomatāalīne ravī / Grīpas un saaukstēšanas sīptomu īslaīcīgai atvīglošanai (drudzīs, drebuļī, sāpes).

DOZAVĪMAS / ANNUSTAMINE/DEVAS

Ⓜ Suaugusīems žmōnēms (īskaitant senyvus) īr vyresnīems kaīp 12 metū vaīkams: vīeno pakētelīo turīnī īstīrīpītī stīklīnēje karsto vandens īr gertī kas 4-6 val., bet ne daugīau kaīp 4 pakētelīus per 24 val. Negalīma dozēs gertī dāzīnīau neī kas 4 valandas.

Vaīkams īkī 12 metū vaīsto vartotī negalīma. Vartotī per burnā. Pīrēs vartojīmā pērskaītykīte pakotēs lapelī. Laīkytī vaīkams nepastebīmōje īr nepasīekīamōje vīetoje. Negalīma vīrsytī nurodytos dozēs. Nevartokīte su kītais vaīstais, kurīū sudrētyje yra paracetamolīo, vaīstais, kurīe māzīna glēivīnēs paburkīmā arba vaīstais pērsalīmui gydītī.

Ⓜ Tāīskasvanud (sealhulgas eakad patsīendīd) ja ūle 12-aastased lapsed: tūhījendāge ūhe pakīkese sīsu tassī, īlīsage kūuma vettī ja jooge īga 4-6 tunnī jārē, aga mīlīte rōhkem kūrī 4 pakīkēst 24 tunnī jooksul. Arge vōtke sagedamīnī kūrī īga 4 tunnī jārē.

Arge andke ravīmīt ālīa 12-aastastele lastele īlīma arstī soovītuseta. Suūkaudne. Enne ravīmī kasutamīst lugege pakēndī īnfolēhte. Hoida laste eest varjātud ja kāttēsaamātus kohas. Arge ūlētage ettenāhtud annust. Arge kasutage koos teīste paracetamolīo sīsdavate ravīmītega vōī mūude ravīmītega, mīs on mōeldud kōha ja kūlmetuse vōī nīnakīmīsuse lēevēndamīseks.

Ⓜ Pieaugušājīm (īeskāitot vecus cīlvēkus) un bērnmēm no 12 gadu vecuma: vīenas pacīnas saturu īberīet krūzē ar karstu ūdenī un līetojīet reīzī 4-6 stundās, bet ne vairāk par 4 pacīnām 24 stundu laīkā. Nelīetot bīezāk kā reīzī 4 stundās.

Bērnmēm līdz 12 gadu vecumam: nav īeteīcams. Īekšgīgai līetošanai. Pīrēs līetošanas īzlasīet līetošanas īnstrukcīju. Uzglabāt bērnmēm nēredzāmā un nepīejāmā vīetā. Nepārsnīegt īeteīktās devas. Nelīetot vīenlaīkus ar cītam zālēm, kas satur paracetamolū, vai ar zālēm, kas māzīna saaukstēšanas, grīpas un aīzīlīkta degna sīptomus.

CT10476C



4 742041 002679 >

Serīja/Partī nr/Serīja:

VARNISH FREE

Tīnka īkī / Kōlībīk kūnī/Derīgs līdz:



VARNISH FREE



